

Chronique ornithologique valaisanne: de l'hiver 1998-1999 à l'automne 1999

Rapport de la Centrale ornithologique valaisanne

par Emmanuel Revaz¹

Bull. Murithienne 118: 67-82

EINLEITUNG

Ornithologische Chronik für das Wallis von Winter 1998-1999 bis Herbst 1999

Ein Jahr nach dem Erscheinen des Schweizer Brutvogelatlas und drei Jahre nach Abschluss der Feldaufnahmen für dieses Werk, war das ornithologische Jahr 1999 geprägt durch die Lancierung des "Monitoring Häufige Brutvögel". Dieses Langzeit-Projekt wird im ganzen Land durchgeführt und von der Schweizerischen Vogelwarte koordiniert. Auch etliche Walliser Ornithologen haben sich diesen Arbeiten angeschlossen. Mit dem Unterfangen wird bezweckt, die Bestandsentwicklung der häufigen Arten zu dokumentieren. Bisher hatten sich die meisten Erhebungen darauf beschränkt, die Bestände seltener oder offensichtlich abnehmender Arten zu überwachen. Die verschiedenen in unserem Kanton anzutreffenden Vogelgemeinschaften (der landwirtschaftlich genutzten Ebenen, der Hänge, des subalpinen Waldes, der alpinen Stufe...) werden also einmal mehr unter die Lupe genommen!

Dazu wurden, ebenfalls unter der Ägide der Vogelwarte, vertiefende Studien an besonderen Arten wie dem **WIEDEHOPF**, der **ZWERGÖHREULE**, dem **ZIEGENMELKER** und dem **SCHWARZKEHLCHEN** durchgeführt; auch an den Populationen von **FLUSSUFERLÄUFER** und – **REGENPFEIFER** im Pfywald wurde die regelmässige Überwachung fortgesetzt.

Neben diesen speziellen Projekten gingen die "gewöhnlichen" feldornithologischen Aktivitäten weiter; diese neue Chronik wurde basierend auf 6 900 Beobachtungen erstellt, die von Ornithologen des Wallis oder der übrigen Landesteile eingesandt worden waren. Ihnen allen sei für diese unverzichtbare Mitarbeit wärmstens gedankt! Alle Meldungen sind für uns wertvoll: Erst die Gesamtheit dieser Informationen ermöglicht nämlich eine echte Synthese. Für deren ausgezeichnete Mitarbeit möchten wir folgenden Leuten herzlich danken: Bertrand Posse, Walliser Ornithologische Zentrale und *Centrale ornithologique romande*, der insbesondere die Durchsicht des Manuskriptes übernommen hat; Bernard Volet und Hans Schmid von der Schweizerischen Vogelwarte (Übersetzung ins Deutsche); Jean-Claude Praz und Anita Praz vom Naturhistorischen Museum Sitten und von der *Murithienne*; Jérôme Fournier, der seine Zeichnungen zur Verfügung stellte.

INTRODUCTION

Une année après la parution de l'Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse et trois ans après la fin de la campagne de terrain qui l'avait précédée, l'année ornithologique 1999 fut marquée par le lancement du «Monitoring des oiseaux nicheurs répandus», un projet de longue haleine mené dans tout le pays par la Station ornithologique suisse, et auquel plusieurs ornithologues valaisans se sont associés; le but d'une telle entreprise consiste à appréhender l'évolution des effectifs des espèces fréquentes, les programmes de surveillance ayant été généralement limités jusqu'à ce jour aux espèces rares ou à celles dont les populations déclinaient de façon évidente. Les communautés aviennes de différents paysages rencontrés dans notre canton (plaine agricole, coteau, forêt subalpine, étage alpin...) sont donc une nouvelle fois sous la loupe!

En outre, toujours sous l'égide de la Station ornithologique, des études approfondies ont porté sur les espèces nicheuses emblématiques que sont la **HUPPE**, le **PETIT-DUC**, l'**ENGOULEVENT** et le **TARIER PÂTRE**; quant aux populations de **PETIT GRAVELOT** et de **CHEVALIER GUIGNETTE** de Finges, elles font toujours l'objet d'un suivi régulier.

Parallèlement à ces projets particuliers, l'activité ornithologique «ordinaire» se poursuit de façon constante; cette nouvelle chronique a été rédigée sur la base d'environ 6 900 données, envoyées par les observateurs du canton et du reste de la Suisse. Que tous soient ici chaleureusement remerciés pour leur indispensable concours; toutes les observations nous sont profitables: c'est la masse intégrale des informations qui permet une véritable synthèse. Pour leur collaboration sans faille, nous tenons également à exprimer notre amicale reconnaissance à Bertrand Posse, des Centrales ornithologiques valaisanne et romande, qui s'est notamment chargé de la relecture du texte; à Bernard Volet et Hans Schmid de la Station ornithologique, le second nommé ayant effectué les traductions allemandes; à Jean-Claude Praz et Anita Praz, du Musée cantonal d'histoire naturelle de Sion et de la Murithienne; à Jérôme Fournier, qui a mis ses dessins à notre disposition.



118 • 2000
Page 67

¹ Rte de Fully 27, 1920 Martigny



118 • 2000
Page 68

Abréviations des noms d'observateurs Abkürzungen der Beobachternamen

A: rA = R. Arlettaz – **B:** siB = S. Bächli; mBn = Max Baumann; pBs = P. Bosshard; piB = P.-J. Brändli; rBu = R. Burri – **C:** gCa = G. Carron; yCr = Y. Crettenand – **D:** mD = M. Desfayes; cId = Cl. Dirac; jmD = J.-M. Duflon; hDu = H. Duperrex; jDp = J. Duplain – **E:** fE = F. Estoppey – **F:** jeF = J. Fournier; yFr = Y. Frutig – **G:** jmGa = J.-M. Gaillard; Ga = J.-P. Gaillard; rGa = R. Gautier; mGe = M. Gerber; jGr = J. Gremaud – **H:** jHa = J. Hartmann – **I:** rIm = R. Imstepf – **J:** nJ = N. Jordan; adJ = A. Jordi; moJ = M. Julien – **K:** mKa = M. Kappeli; Ker = P. Kernen; dKr = D. Kronauer – **L:** aLu = A. Lugon; rLu = R. Lugon – **M:** paM = P. Marchesi; liM = L. Maumary; bM = B. Michellod – **N:** frN = Fr. Nievergelt – **O:** paO = P.-A. Oggier – **P:** mPe = M. Perraudin; jPi = B. Piot; beP = B. Posse; Pra = Ch. Praz; jCp = J.-C. Praz – **R:** eRe = E. Revaz; Rey = J. Rey – **S:** Sal = P. Salzgeber; eS = E. Sermet; aSi = A. Sierro; jS = J. Strahm – **T:** mTh = M. Thélin; jCT = J.-Cl. Tièche; oTu = O. Turin – **V:** rV = R. Voisin; bV = B. Volet – **W:** pWa = P. Walsen; phW = Ph. Werner. Puis: **CAVS** = Commission de l'avifaune suisse – **div. obs.** = divers observateurs – **HS** = Haute-Savoie – **PN** = Parc national.

AUTRES ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE TEXTE:

ad = adulte; **ch** = chanteur; **c** = couple; **f** = femelle; **imm** = immature; **ind** = individu; **juv** = juvénile; **m** = mâle; **max** = maximum; **min** = minimum; **subad** = subadulte; **ssp** = sous-espèce.

L'HIVER 1998/99 • WINTER 1998/99

Le début de l'hiver valaisan, avec des chutes de neige jusqu'en plaine aux premiers jours de décembre, fut marqué par d'importantes concentrations d'oiseaux en divers points du canton: **BRUANTS JAUNES**, auxquels se joignirent quelques **BRUANTS ZIZI** et **PROYERS** et surtout un **BRUANT À CALOTTE BLANCHE**, **LINOTTES** et **ETOURNEAUX** formèrent des troupes d'une ampleur inhabituelle pour la période. Certaines de ces espèces, auxquelles l'on ajoutera le **CHARDONNERET**, restèrent bien présentes durant toute la saison, les conditions demeurant par la suite clémentes jusqu'à la fin du mois de janvier, qui s'avéra en moyenne 2.6 °C plus chaud que d'ordinaire. Durant le mois de février cependant, l'hiver fit une cinglante réapparition, et l'on enregistra partout dans le canton des précipitations exceptionnelles, avec pour conséquence une épaisse couche de neige persistante jusqu'en plaine; la situation devint donc bien difficile pour les oiseaux, particulièrement ceux de montagne, comme la **BARTAVELLE**, le **CRABE** ou encore l'**ACCENTEUR ALPIN**, que l'on vit régulièrement aux basses altitudes.

Der Auftakt des Winters im Wallis, mit Schneefällen in den ersten Dezembertagen bis in die Talsohlen, war an verschiedenen Stellen des Kantons gekennzeichnet von starken Vogelkonzentrationen: **GOLDAMMERN**, unter die sich einige **ZAUN** – und **GRAUAMMERN** und insbesondere eine **FICHTENAMMER** mischten. Dazu **HÄNFLINGE** und **STARE**, die Trupps von zu dieser Jahreszeit ungewöhnlicher Grösse bildeten. Verschiedene dieser Arten, noch dazu auch **DISTELFINKEN**, blieben während der ganzen Saison gut präsent. Sie profitierten von den anschliessend bis

Ende Januar milden Bedingungen, fiel doch der Januar um 2.6 °C wärmer aus als normal. Während des Februars kehrte jedoch der Winter vehement zurück. Es gab im ganzen Kanton aussergewöhnlich starke Niederschläge, so dass sich eine dicke Schneeschicht bis hinunter in die Talsohlen hartnäckig hielt. Die Situation wurde deshalb für die Vögel recht schwierig, namentlich für Bergvögel wie das **STEINHUHN**, die **ALPENKRÄHE** und die **ALPENBRAUNELLE**, die man regelmässig in den tiefen Lagen sah.

GRÈBE CASTAGNEUX, ZWERGTAUCHER

Faible présence hivernale: 6-7 ind notés à Grône entre le 17.12 et le 9.1 (mPe, Rey, aSi), et 1-2 ind à Sierre entre le 26.12 et le 4.2 (mPe, Rey).

GRÈBE ESCLAVON, OHRENTAUCHER

Un le 30.12 sur le lac à St-Gingolph (nJ).

GRAND CORMORAN, KORMORAN

Hormis le Chablais, 1-3 ind vus entre décembre et février à Sierre (mPe, jCp, Rey, aSi) et 1 remontant le Rhône le 20.12 à Sion (aSi).

BUTOR ÉTOILÉ, ROHRDOMMEL

Un le 24.2 à Vionnaz (eS).

HÉRON CENDRÉ, GRAUREIHER

Très discret en amont de St-Maurice: 1-3 ind vus à Sierre entre le 9.12 et le 4.2 (Rey, aSi), et mentions d'isolés le 12.2 à Dorénaz et le 26.2 à Martigny (beP). Les 8 ind signalés à Grône le 4.1 (Rey) constituent donc le plus gros groupe pour la saison.

CYGNE TUBERCULÉ, HÖCKERSCHWAN

Dans le Chablais, max de 46 ind le 10.12 à Collombey-Muraz, où la présence d'une dizaine d'ind est d'ailleurs continue durant le mois de décembre (rV). Ailleurs, 3 ind vus entre le 2 et le 10.12 à Sierre (mPe, aSi) et 3 le 30.12 à Sion (P.-A. Milhit).

CANARD SIFFLEUR, PFEIFENTE

Un les 2 et 7.12 à Sierre (mPe, aSi).

CANARD CHIPEAU, SCHNATTERENTE

Au Bouveret, une dizaine le 28.12 et 3 le 22.1 (jCt).

SARCELLE D'HIVER, KRICKENTE

20 à 32 ind séjournent durant tout l'hiver à Grône-Sierre (mPe, Rey, aSi, jCt). Ailleurs, mentionnée en décembre à Vionnaz jusqu'au 15 (rV), ainsi qu'à Martigny du 11 au 23 (max de 8 ind le 20.12; beP, eRe).

CANARD COLVERT, STOCKENTE

Environ 120 à 200 ind sont signalés à Grône-Sierre entre début décembre et fin février (mPe, aSi, jCt). Seule mention en dehors de ce site d'hivernage, un groupe de 56 ind le 23.12 à Martigny (beP).

CANARD SOUCHET, LÖFFELENTE

Une douzaine le 28.12 sur le lac au Bouveret (jCt).

FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE

Des 9 ind observés le 7.12 à Sierre (mPe), 1-2 resteront pour un hivernage partiel en tout cas jusqu'au 12.1 (mPe, Rey, aSi).

FULIGULE MORILLON, REIHERENTE

Une f séjourné à Grône-Sierre entre le 4.1 et le 2.3 (mPe, Rey, jCt).

GARROT À CEIL D'OR, SCHELLENTE

L'ind vu le 2.12 à Granges/Sierre (aSi) constitue l'une des rares mentions valaisannes, lac excepté.

MILAN ROYAL, ROTMILAN

Deux mentions de décembre qui resteront sans suite: un le 8 à Fully (beP) et un le 21 à Collombey-Muraz (rV).

GYPAÈTE BARBU, BARTGEIER

Trubel reste un nouvel l'hiver dans la région de Leukerbad; le 23.2, après les très fortes chutes de neige, il est observé survolant le village de Salquenen, à une altitude de 650 m (rA, beP, G. Salamin). Crystal (HS 1998) semble rôder sur les

hauts de Fully, où il est vu le 23.1 et le 20.2 (S. Mettaz), et son contemporain République 11 (HS 1998) est signalé du 15.2 (T. Roduit) au 3.3 (bM) entre Fully et Vétroz. Ailleurs, des subad/ad non identifiés sont vus le 19.12 à Val d'Illiez (Cl. Deschenaux), le 16.1 sur Conthey, 2580 m (M. Défago) et le 26.2 à Chamoson (bM, F. Udry).

BUSARD SAINT-MARTIN, KORNWEIHE

A l'image de la très grande discrétion constatée à l'échelle nationale, très peu vu, et aucun hivernage documenté: 1-2 ind entre Vouvry et Collombey-Muraz durant la première quinzaine de décembre (beP, eRe, rV), et un le 20.1 à Port-Valais (nJ).

AIGLE ROYAL, STEINADLER

Durant le mois de février, plusieurs ind (jusqu'à 6 le 27.2) gagnent les basses altitudes à Leuk, 700 m (liM).

FAUCON CRÉCERELLE, TURMFALKE

eS le note rare dans la basse plaine du Rhône durant l'hiver, alors que beP annonce le retour de l'espèce en plaine de Martigny le 2.3.

FAUCON ÉMERILLON, MERLIN

Mentionné uniquement à Vouvry jusqu'au 1.1 (nJ, beP, eRe, rV).

PERDRIX BARTAVELLE, STEINHUHN

L'espèce a probablement bien souffert des conditions hivernales particulièrement rudes; à noter 5 ind le 10.2 sur une route à voitures de Leuk, 700 m (liM).

RALE D'EAU, WASSERRALLE

Un les 7-9.12 à Sierre (mPe; Rey) et 2 le 2.2 à Martigny (oTu).

GALLINULE POULE-D'EAU, TEICHHUHN

Peu vue; une le 2.12 à Collonges (J.-P. Reitz), une le 14.12 à Fully (N. Erard), 5 le 17.12 à Grône (Rey) et 2 en décembre-janvier à Sierre (Rey, aSi).

FOULQUE MACROULE, BLÄSSHUHN

Une centaine d'ind au min, le 9.1 à Grône (jCT).

VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ

A Vouvry, 4 ind le 7.12 et 1 le 13.12 (eS); à Visp, un le 13.12 (Sal).

BÉCASSINE DES MARAIS, BEKASSINE

Vue le 5.12 et le 13.2 à Port-Valais (yCr; G. Gilliéron), et le 5.12 au bord du Rhône de Vouvry (yCr).

BÉCASSE, WALDSCHNEPPE

Encore une observation le 3.12 à Salgesch (jCP).

COURLIS CENDRÉ, GROSSER BRACHVOGEL

Les 4 ind vus le 5.12 à Port-Valais en vol amont (yCr) sont très probablement les mêmes que ceux signalés par eS le 7.12 à Vouvry.

MOUETTE RIEUSE, LACHMÖWE

Vue durant la première quinzaine de décembre à Vouvry, avec un max de 22 ind le 1.12 (rV). Ailleurs, quelques ind vus à Sierre durant la première décade de décembre: 5 oiseaux le 3.12 puis 2 le 7.12 (jCP; mPe).

GOÉLAND CENDRÉ, STURMMÖWE

Seule observation hors-Chablais, un le 22.12 à Sierre (Rey); 5 mentions de Vouvry-Vionnaz, dont des max de 23 ind le 1.12 et de 19 ind le 9.1 (rV).

GOÉLAND BRUN, HERINGSMÖWE

Un le 13.12 à Vouvry (beP, eRe).

GOÉLAND LEUCOPHÉE, WEISSKOPFMÖWE

2 mentions dans les champs de Vouvry: au moins 17 ind le 13.12 (beP, eRe) puis 12 le 10.1 (I. Henry).

PIGEON RAMIER, RINGELTAUBE

Hivernage noté à Vionnaz et Collombey-Muraz (eS, jCT, rV), avec un max d'une cinquantaine d'ind le 15.12 (rV).

EFFRAIE, SCHLEIEREULE

Des pelotes de réjection découvertes le 6.12 dans un hangar agricole de Vouvry (nJ), une en chasse le 5.1 à Conthey (yCr) et un ind – ayant souffert comme bien d'autres en Suisse de l'enneigement prolongé – trouvé mort en février à Martigny (Anonyme par bM).

HIBOU MOYEN-DUC, WALDOHREULE

Une plumée trouvée le 27.2 à Ardon (beP, eRe).

MARTIN-PÊCHEUR, EISVOGEL

Vu durant la première moitié de décembre à Vionnaz-Vouvry (beP, rV), le 10.12 à Port-Valais, le 17.12 à Grône et le 26.12 à Sierre (Rey). Une seule donnée de janvier, le 9 à Vernayaz (jeF).

ALOUETTE LULU, HEIDELERCHE

2 le 3.12 en région sierroise (Rey) et présence notée au début du mois de février à Savèse (bM).

ALOUETTE DES CHAMPS, FELDLERCHE

Quelques troupes mentionnées en décembre-janvier: une cinquantaine le 8.12 à Martigny (beP), 6 le 13.12 puis une quarantaine le 10.1 à Vouvry (beP, eRe; I. Henry) et 50 le 19.1 à Sion (jCP).

PIPIT FARLOUSE, WIESENPIEPER

20 le 7.12 à Vouvry (eS), 2 le même jour à Dorénaz (eRe), 3 les 23 et 26.12 à Vionnaz-Collombey-Muraz (eS), 12 les 12 et 25.1 à Sion (aSi) et 2 le 14.2 à Martigny (beP).

BERGERONNETTE GRISE, BACHSTELZE

En décembre, 9 observations de 1-4 ind en provenance de Vouvry, Dorénaz, Martigny et Fully (eS, beP, eRe); une seule



Accenteur alpin (Alpenbraunelle) – PHOTO JÉRÔME FOURNIER

mention de janvier, 5 ind au milieu des moutons le 16.1 à Collombey-Muraz (beP, eRe).

ACCENTEUR MOUCHET, HECKENBRAUNELLE

5 observations en décembre, 6 en janvier et 11 en février, toutes réparties entre Martigny et Leuk, excepté les mentions des 4 et 16.1 à Vionnaz (jCT; eS).

ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE

Beau total de 45 observations, dont une trentaine pour le seul mois de février: l'espèce, fuyant alors les très fortes chutes de neige en altitude, tente de trouver refuge en plaine ou sur les coteaux; aussi des troupes comptant jusqu'à 15 ind sont-elles observées du 10 au 23.2 à Leuk, entre 700 et 900 m (liM et al), 1-2 ind sont vus les 11-12.2 en gare de St-Maurice, 420 m (eRe), 1 ind les 11 et 14.2 à Fully, 500 m (beP; eRe), 2 le 12.2 à Collombey-Muraz, 630 m (M. Barazategui), 5 le 13.2 à Saillon, 8 le 14.2 à Sion (jCP) et 1 le 23.2 à Varen, 720 m (beP), dernière mention de basse altitude.

ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ

Bien vu cet hiver: 20 observations en provenance de 16 localités, de Vouvry à Baltschieder.

PÂTRE, SCHWARZKEHLCHEN

Quelques tentatives d'hivernage, avortées courant janvier: à Collombey-Muraz, 1-2 ind vus le 13.12, le 12.1 et le 16.1 (jmF, beP, eRe); à Dorénaz, 3 ind le 7.12 puis un seul le 8.1 (eRe); à Martigny, 1-2 ind le 8.12, le 12.12 et le 9.1 (beP, eRe). La présence de 2 ind le 13.2 à Collonges (nJ) résulte peut-être d'un vagabondage hivernal.

MERLE NOIR, AMSEL

Un rassemblement de 45 ind le 23.12 dans un verger de Vouvry (eS).

GRIVE LITORNE, WACHOLDERDROSSEL

Peu signalée: 2 ind le 10.1 à Saas-Fee, 1790 m (moJ, jS), et 3-4 troupes d'une quarantaine d'ind en déplacement de fuite le 11.2 à Martigny, par 50 cm de neige au sol (beP).

GRIVE MUSICIENNE, SINGDROSSEL

Quasi-absence; seule observation, 2 ind le 4.12 à Martigny (beP).

GRIVE MAUVIS, ROTDROSSEL

2 le 26.12 à St-Léonard (aSi), mais surtout une importante troupe d'une quarantaine d'ind qui séjourne du 9 au 14.1 à Saas Fee, 1790 m (moJ, jS): pour cette dernière observation, tant l'ampleur du rassemblement que le lieu et l'altitude sont remarquables.

FAUVETTE À TÊTE NOIRE, MÖNCHSGRASMÜCKE

Présence continue (du 6.12 au 25.2) de 1-3 ind en région sierroise (Rey), une le 13.2 à Sion (rA) et une autre capturée par un chat le 25.2, également à Sion (J.-P. Crisinel).

POUILLOT VÉLOCE, ZILPZALP

Belle présence en décembre, avec 9 mentions de 6 localités. Plus tard, l'espèce n'est revue que le 13.1 à Martigny (beP) et le 27.2 à Visp (3 ind; Ker), où l'hivernage n'est pas à exclure.

ROITELET À TRIPLE BANDEAU, SOMMERGOLDHÄHNCHEN

Une présence hivernale, le 26.12 à Sierre (mPe).

TICHODROME, MAUERLÄUFER

Vu sur le bas coteau le 22.12 à Bratsch, 800 m (mKa), et en plaine du 2 au 11.2 sur les murs d'endiguement de la Dranse à Martigny (oTu; beP) et le 25.2 à Vionnaz (nJ).

CRABE, ALPENKRÄHE

Notamment 3 à 8 ind sur le bas coteau de Leuk, du 10 au 27.2 (div. obs.), qui peinent à trouver des terrains favorables à la recherche d'invertébrés en raison de l'importante couche de neige (rA, beP).

CORBEAU FREUX, SAATKRÄHE

L'espèce est vue durant la première décade de décembre à Monthey: 15 ind le 6.12 et 24 ind le 7.12, deux groupes en provenance du val d'Illeiez et gagnant la plaine (rV).

CORNEILLE MANTÉE, NEBELKRÄHE

Une le 13.12 à Collombey-Muraz (beP, eRe) et une le 4.1 à Greich, 1950 m (P. Mosimann)..

ETOURNEAU, STAR

Très bon hivernage malgré la neige, avec des troupes d'une ampleur inhabituelle. Deux pôles monopolisent la plus grande partie des effectifs hivernants: Vouvry-Vionnaz tout d'abord, avec un max de 220 ind le 5.1 (rV); Grône-St-Léonard ensuite, avec un max impressionnant de 1000 ind le 13.12 (jcP). De petites troupes sont également signalées à Martigny, Saillon, Ardon, Sion et dans la région sierroise.

MOINEAU FRIQUET, FELDSPERLING

Concentration de 150 ind le 11.12 à Martigny (beP).

NIVEROLLE, SCHNEESPERLING

La plus grande troupe signalée est constituée de 54 ind, et est observée le 8.2 à Thyon, 2090 m (H.-R. Flück). En outre, relevons la présence le 5.3 d'un ind dans les vignes de Salgesch, 790 m (rA).

PINSON DU NORD, BERGFINK

Une quinzaine d'ind séjournent à Monthey du 31.1 au 8.3 (rV).

SERIN, GIRLITZ


Assez bien vu en décembre: 2 le 1.12 à Steg (mKa), max de 30 le 8.12 à Martigny (beP), max de 14 le 10.12 à Monthey (rV), et 3 le 29.12 à Sion (Rey). Une seule mention pour les mois de janvier-février: 2 le 14.2 à Sion (jcP).

VENTURON, ZITRONENGIRLITZ

Encore 4 ind à plus de 2000 m le 30.12 au-dessus d'Evolène (jcP); bien discret en décembre-janvier, mais présence régulière à basse altitude du 11.2 au 2.3, en raison de la très forte quantité de neige: mentions de 1-10 ind en provenance de 6 localités, entre 460 et 880 m.

CHARDONNET, DISTELFINK

Très nombreuses observations, en provenance de la plaine



Bruant jaune (Goldammer). – DESSIN DE JÉRÔME FOURNIER

et du coteau: 32 en décembre, 23 en janvier et 18 en février; 22 localités concernées, de Monthey à Visp. Les plus grands groupes sont ceux de 80 ind le 11.1 à Sion (aSi) et de 90 ind le 16.2 à Leuk (jDp).

LINOTTE, HÄNFLING

A l'instar de l'espèce précédente, présence hivernale bien plus rapportée qu'à l'accoutumée, avec notamment des grandes troupes signalées en décembre: une centaine le 7.12 à Vouvry (eS) et un min de 250 (!) le 8.12 à Martigny (beP). Mis à part ces deux localités, également rencontrée en décembre-janvier-février dans la région sierroise (1-9 ind; Rey), le 1.12 à Hochtenn, 1000 m (4 ind; mKa) et le 27.2 à Ardon (5 ind; beP). Soulignons enfin une observation relativement élevée, le 28.12 à Lens, 1220 m (4 ind; Rey).

SIZERIN, BIRKENZEISIG

A Monthey uniquement: 6 puis 2 ind les 18 et 21.2 (rV).

GROSBEK, KERNBEISSER

Un hivernant à Veyras, vu du 29.12 au 28.3 (Rey), 1-2 à Monthey du 7.12 au 18.2 (rV), 4 à Sion le 12.1, le 25.1 et le 12.2 (aSi).

BRUANT À CALOTTE BLANCHE, FICHTENAMMER

Un m les 8 et 10.12 à Martigny, au milieu de 300 Bruants jaunes (beP; CAvS), constitue la 4^e mention pour le pays, et la 2^e pour le canton.

BRUANT JAUNE, GOLDAMMER

Les chutes de neige du début décembre provoquent une concentration d'une rare ampleur à Martigny, où l'on compte 300 ind les 8 et 12.2 (beP). L'effectif s'érode ensuite très rapidement suite au retour de la pluie, et le 14.12 l'on ne dénombre plus que 50 ind (beP); mais l'espèce restera cependant bien présente dans la région (notamment 90 ind le 13.1), la taille des groupes fluctuant avec l'enneigement (beP). En dehors du coude du Rhône, peu de données: 4 ind le 15.12 à St-Léonard (Rey), et 10 le 8.2 à Montana, 1250 m (aSi).

BRUANT ZIZI, ZAUNAMMER

1-3 ind du 8 au 12.12 à Martigny (cID, beP, eRe).

BRUANT FOU, ZIPPAMMER

Quelques hivernants signalés durant tout l'hiver sur le coteau sierrois (Rey, aSi) et au coude du Rhône (max de 12 ind le 14.12; beP), et plus sporadiquement dans le centre entre Sion et Ayent (Rey, aSi). Données ponctuelles: 3 ind le 7.12 à St-Maurice (paM) et 1 le 7.1 à Leuk (jcT).

BRUANT DES ROSEAUX

7 mentions de Collombey-Muraz, Martigny (beP), Ardon (aSi) et Grône (Rey, aSi).

BRUANT PROYER, GRAUAMMER

1-2 du 10 au 14.12 à Martigny (cID, beP, eRe).



LE PRINTEMPS ET L'ÉTÉ 1999 FRUHLJAHR UND SOMMER 1999

Après un mois de mars chaud et sec, qui n'est peut-être pas étranger au retour hâtif de certains migrateurs transsahariens comme le **MARTINET NOIR** ou le **ROSSIGNOL**, le printemps fut des plus humides. La neige qui tomba abondamment en altitude durant le mois d'avril refoula momentanément vers les plaines **PIPITS SPIONCELLES** et **TRAQUETS MOTTEUX**. Ces conditions pluvieuses faisant suite à l'important enneigement de février, des champs restèrent longtemps inondés et représentèrent des lieux d'escale inespérés pour toute une série d'Echassiers. Dans ce contexte, le pôle d'attraction printanier se situa sans conteste dans la région de Vouvry, où l'on vit en ce seul printemps 1999 défiler pas moins de 17 espèces de **LIMICOLES**, parfois en grand nombre; à ce propos, la halte de trois **ECHASSES** reflète l'invasion constatée à l'échelle nationale. D'un point de vue plus spécifique, la saison réserva comme à l'accoutumée son lot d'originalités: **VAUTOUR PERCNOPTÈRE**, **GOBEMOUCHE À COLLIER**, et premières mentions de **FAUCON CRÉCERELLETTE** et de **GOBEMOUCHE NAIN** furent de celles-ci.

Nach einem warmen und trockenen März, der vielleicht an der frühen Rückkehr einiger Transsaharazieher wie dem **MAUSERGLER** und der **NACHTIGALL** nicht unbeteiligt war, wurde das Frühjahr sehr feucht. Die grossen Schneemengen, die im April in der Höhe fielen, drückte **BERGPIEPER** und **STEINSCHMÄTZER** wieder ins Tal. Die starken Niederschläge, welche den massiven Schneefälle des Februar folgten, setzten viele Felder lange unter Wasser. Dadurch entstanden unerwartet Rastplätze für eine ganze Reihe von **LIMIKOLEN**. Der Hauptanziehungspunkt bildete dabei unbestritten die Gegend von Vouvry, wo im Frühjahr nicht weniger als 17 Limikolen-arten, manchmal in grosser Zahl, gesehen werden konnten. Der dortige Halt von 3 **STELZENLÄUFERN** widerspiegelt die Invasion, die landesweit stattfand. Wie gewohnt wartete diese Jahreszeit mit einigen Besonderheiten auf: **SCHMUTZGEIER**, **HALS-BANDSCHNÄPPER** sowie die ersten Nachweise des **RÖTEL-FALKEN** und des **ZWERGSCHNÄPPERS** waren darunter.

GRÈBE CASTAGNEUX, ZWERGTAUCHER

Retour remarqué le 28.3 à Grône (4 ind; aSi) et le 3.4 à Martigny (2 ind; beP, eRe).

GRÈBE HUPPÉ, HAUBENTAUCHER

2 premiers migrateurs vus le 14.2 sur le Rhône à Martigny (eRe). En dehors des dates traditionnelles de migration, 1 ind observé entre le 18.4 et le 3.6 à Conthey (aSi, beP) et 1 le 28.6 à Leuk (eRe).

GRAND CORMORAN, KORMORAN

Observations échelonnées entre le 3.3 à Martigny et Sion (jeF) et le 16.5 à Turttmann (mGe) et Fully (beP, eRe).

BLONGIOS NAIN, ZWERGDOMMEL

En dehors des sites de nidification certaine ou supposée, vu à Martigny le 14.5 (beP).

BIHOREAU GRIS, NACHTREIHER

Arrivée en force le 26.3 déjà, avec 6 ind à Leuk (eRe), puis 8 du 27 au 30.3 (mBn, rLu, mPe, eRe, Sal), max printanier. En dehors de ce site, où l'espèce est vue à 17 reprises entre

le 26.3 et le 24.5 (A. Gerber), migrateurs isolés ou par deux le 21.4 et le 3.5 à Grône (aSi; pjB), le 22.4 et les 7-9.5 à Martigny (beP; YFr, beP, jcT), le 13.5 et le 14.6 à Conthey (beP; rA), le 28.5 à Monthey (jcT) et le 14.6 à Ardon (rA, aSi).

CRABIER CHEVELU, RALLENREIHER

Un le 20.5 à Leuk (dKr) et un le 23.5 dans un champ inondé de Vouvry (R. Aye, hDu, J. Fischer, adj).

HÉRON GARDE-BOEUF, KUHEIHER

Les 3 observations de mars, très hâtives, concernent probablement le même oiseau: le 10 à Sierre (jcP, Rey), le 11 à Fully (yCr) et le 13 à Saillon (jcP).

AIGRETTE GARZETTE, SEIDENREIHER

Très bonne année, comme dans le reste du pays d'ailleurs. Premières observations le 26.4, avec 2 individus à Sierre (Rey) et 4 à Leuk (rBu, adj, eRe); suivent 3 ind les 28 et 30.4 à Grône (Rey, aSi). C'est à Vouvry que se concentrent la majorité des observations, où plusieurs oiseaux occupent un champ inondé durant toute la dernière décade de mai, avec un max de 10 ind les 21 (rV) et 23.5 (div. obs.); l'espèce est également bien vue à Martigny, où 1-4 ind sont mentionnés à 5 reprises entre le 8 et le 23.5 (beP; R. Aye, hDu, adj, aSi). Ailleurs, notons des isolées le 1.5 à Gampel (hDu), le 8.5 à St-Léonard (rA) et le 21.5 à Evionnaz (jeF).

GRANDE AIGRETTE, SILBERREIHER

Une du 25 au 28.3 à Leuk (rLu, eRe, Sal).

HÉRON POURPRÉ, PURPURREIHER

Premiers le 13.4 à Gampel et le lendemain à Grône (Rey), puis régulièrement observé entre le 27.4 à Leuk (rBu, adj, Rey) et le 30.5 à Grône (Rey); max de 3 ind le 28.4 à Leuk (eRe). Hormis les localités déjà citées, également signalé à Vionnaz (vu une fois en juin; Cl. Rey), à Martigny les 10, 11 et 16.5 (jmD, hDu, beP), à Sierre le 1.5 (2 ind; Rey) et à Turttmann les 1 et 8.5 (hDu; pjB).

CIGOGNE NOIRE, SCHWARZSTORCH

Deux mentions printanières: une migratrice en provenance de l'amont se pose à Grône au soir du 29.3 (mPe), puis y est revue le lendemain (aSi); une autre en vol aval le 9.5 sur Fully, 900 m (eRe).

CIGOGNE BLANCHE, WEISSSTORCH

Isolées le 12.3 à Salgesch (Rey), les 26-27.3 à Simplon, 1480 m (A. Gerold), le 9.4 à Agarn-Turttmann (hDu, liM), le 23.5 à Fully (jDp) et le 28.5 à Martigny (beP); par la suite, 2 puis 1 ind estivent en juin-juillet à Vétroz, l'un d'eux étant victime d'une ligne à haute tension.

CYGNE TUBERCULÉ, HÖCKERSCHWAN

Un c le 28.3 à Sierre, où un ad est trouvé mort le 24.4 (aSi).

CANARD CHIPEAU, SCHNATTERENTE

Remontée des hivernants remarquée à Grône-Sierre entre le 26.2 et le 6.3 (1-3 ind; mPe, Rey).

SARCELLE D'HIVER, KRICKENTE

Retour noté le 28.2 à Monthey (7 ind, rV), le 7.3 à Martigny (2 ind; beP) et le 29.3 à Leuk (eRe). Les effectifs de Grône-Sierre restent plus ou moins constants jusqu'à la fin mars (encore 20 ind le 30.3), avant de chuter brutalement dès le 2.4 (8 ind; Rey); les derniers canards y sont vus le 17.4 (Rey).

SARCELLE D'ÉTÉ, KNÄKENTE

Vue entre le 2.3 à Vouvry (2 ind; rV) et le 17.4 à Grône (Rey); max de 11 ind le 31.3 à Grône (mPe). Hormis ce dernier site, 1 ind le 18.3 à Sion (yCr) et 1 le 23.3 à Martigny (beP).

CANARD SOUCHET, LÖFFELENTE

4 ind le 6.3 à Grône, 2 le 24.3 à Leuk (Rey), 2 le 18.4 à Vouvry (liM). Quant aux 11 canards observés le 28.3 à Aron (Ker), ils constituent un groupe important pour le canton.

NETTE ROUSSE, KOLBENENTE

Un c vu à Grône entre le 23.3 et le 1.4 (rLu, mPe, Rey, aSi).

FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE

1-2 ind observés à Grône-Sierre entre le 2.3 et le 11.3 (mPe, jcP, Rey), et un à Géronde/Sierre du 9 au 18.3 (Rey).

FULIGULE MORILLON, REIHERENTE

Une f les 3 et 9.3 à Gérone/Sierre (Rey), et 2 ind le 13.5 à Lens, 1'140 m (Rey).

EIDER À DUVET, EIDERENTE

2 le 21.4 au Bouveret (jmD).

MACREUSE BRUNE, SAMTENTE

Toujours au Bouveret, 8 les 4 et 6.4 (jmD).

HARLE BIÈVRE, GÄNSESÄGER

2 premiers le 27.2 à Grône (mPe), puis, le lendemain, 3 à Vionnaz et 2 à Collombey-Muraz (rV); dernier le 21.4 sur le Rhône de St-Maurice (eRe). Notons également 4 ind le 14.3 à Saillon (jcP) et 3-4 les 19-20.3 entre Evionnaz et Fully (nJ; hDu).

BONDRÉE APIVORE, WESPENBUSSARD

Retour le 8.5 à Agarn (R. Hauri).

MILAN NOIR, SCHWARZMILAN

Premiers les 19 et 21.3 à Vouvy (eRe; nJ) et le 24.3 à Leuk (Rey); en outre, à noter encore 12 migrants le 16.5 à Fully (beP, eRe).

MILAN ROYAL, ROTMILAN

Premier migrant le 14.2 à Sion (jcP), 4 les 26-27.2 à Leuk (liM), puis isolés le 5.3 à Miège (Rey), le 14.3 à Vouvy (rV), le 25.3 à Grône (mPe), le 1.5 à Leuk (hDu) et le 16.5 à Fully (beP, eRe), date tardive.

GYPAÈTE BARBU, BARTGEIER

Après avoir occupé fidèlement la région de Leukerbad depuis l'automne 1996, Trubel disparaît du canton sans laisser de trace; il est vu une dernière fois le 4.4 (D. Roten), en compagnie de République 11, qui avait été repéré 2 jours auparavant à Montana (R. Sierro). En dehors du site de Leukerbad qu'il semble occuper durant le mois de mai, République 11 est également identifié de façon sûre le 5.6 sur Ardon (C.-A. Delaloye). Un autre oiseau, Gildo (PN 1998) fait également de Leukerbad son centre d'activité, du 10.5 (H. Kälin, D. Roten) au 2.7 (G. Salamin) en tout cas, avec des escapades dans la région de Derborence/Conthey à fin mai – début juin ainsi que le 25.7 (D. Carrard). Total probable de 5-7 ind différents vus à 68 reprises sur la rive gauche du Rhône entre Vouvy et Finhaut, sur la rive droite entre Fully et Leukerbad ainsi que dans la vallée de Conches jusqu'à Münster.

VAUTOUR PERCNOPTÈRE, SCHMUTZGEIER

Un le 25.5 à Leuk, 900 m (pWa; CAVS), 3^e mention valaisanne du siècle et 14^e pour la Suisse.

CIRCAÈTE, SCHLANGENADLER

Première observation le 21.4 à Chermignon (aSi), puis le 8.5 à Leuk (R. Hauri), le 9.5 à Martigny (YFr), le 15.5 à Salgesch (H.-R. Kälin, dKr), le 21.5 à Raron (rA), le 22.5 à Mund (mBn) et le 28.5 à Vouvy (rV). Total de 6-7 estivants répartis sur le coteau: 1-2 à Leuk-Bratsch (beP, eRe, J. Zettel), 1 observé les 17 et 24.7 à Fully-Saillon (rA; beP), 1 le 2.8 à Visp (P. Tröndle) et 3 le 5.8 à Varen (J. Zettel).

BUSARD DES ROSEAUX, ROHRWEIHE

Passage débutant le 28.3 à Vouvy (eRe) et Grône (mPe), s'avère très régulier jusqu'au 30.5 à Leuk (beP, M. Ritschard), date à laquelle il s'interrompt brusquement. Notons que le 25.4, l'espèce est vue en 4 lieux différents du canton: Sierre (Rey), Ardon (beP), Charrat (eRe) et Vouvy (nJ).

BUSARD SAINT-MARTIN, KORNWEIHE

Le 24.3 à Salvan (A. Frachebourg), le 29.3 à Turtmann (eRe), les 18-19.4 à Vionnaz (liM; beP), le 24.4 à Sierre (aSi) et dernier bien tardif le 19.5 à Vouvy (rV).

BUSARD CENDRÉ, WIESENWEIHE

Vu à Vouvy le 24.4 (hDu) et les 6-9.5 (rV), à Fully le 25.4 et le 16.5 (hDu; beP), et à Leuk-Turtmann du 11 au 16.5 (div. obs.) ainsi que le 24.5 (pWa).

BALBUZARD PÊCHEUR, FISCHADLER

1-2 ind en escale à Grône du 17 au 22.4 (Rey, aSi).

FAUCON CRÉCERELLETTE, RÖTELFALKE

Un m le 22.5 à Vouvy (beP, cId et aI), accompagné le lendemain de 2 f (liM et aI): 5^e mention pour la Suisse, 1^{re} valaisanne.

FAUCON CRÉCERELLE, TURMFALKE

Encore 5 migrants qui passent le coude du Rhône/Fully le 16.5 (beP, eRe).

FAUCON KOBEZ, ROTFUSSFALKE

Vu à 8 reprises à Leuk entre le 28.4 (eRe) et le 24.5 (4 ind; pWa), et observé du 17 au 27.5 à Vouvy (div. obs.), où l'on relève un max notable de 11 ind les 17 et 19.5 (jmD; hDu); un ind est également mentionné à Fully le 23.5, le 7.6 et le 16.6 (rA).

FAUCON ÉMERILLON, MERLIN

A Vionnaz-Vouvy le 28.2, le 11.3 (rV) et le 22.4 (hDu, liM); à Agarn le 21.4 (liM).

FAUCON HOBREAU, BAUMFALKE

Migrants signalés à Martigny le 21.4 et le 9.5 (liM; yFr), à Leuk le 10.5 et le 15.5 (M. Roost; G. Oesterheld), à Finges le 25.5 (aLu), à Fully le 16.5 (beP, eRe) et à Riddes le 3.6 (aSi).

CAILLE DES BLÉS, WACHTEL

Premier ch entendu le 1.5 à Leuk (hDu).

RALE D'EAU, WASSERRALLE

L'espèce réapparaît durant la dernière décade de mars; premier le 20.3 à Vionnaz (jcT).

RALE DES GENÊTS, WACHTELKÖNIG

Un ind levé le 11.5 à Martigny (beP).

ECHASSE, STELZENLÄUFER

En cette année d'invasion, 3 les 8-9.5 dans un champ inondé de Vouvy (hDu; rV).

OEDICNÈME, TRIEL

Un erratique le 27.6 à Martigny (hDu, liM).

PETIT GRAVELOT, FLUSSREGENPFIEFER

En dehors des lieux de nidification, vu de passage à Vouvy le 19.3, le 26.3 (4 ind; eRe; beP), le 24.4 (2 ind) et le 24.5 (hDu), à Martigny le 4.4 (2 ind; beP) et le 21.4 (5 ind; liM), à Conthey le 2.5 (jeF) et à Leuk les 2 et 14.5 (2 puis 3 ind; M. Baudraz, N. Koller; beP).

GRAND GRAVELOT, SANDREGENPFIEFER

Un à Vouvy les 11 et 13.5 (hDu, jDp, L. Frutig).

VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ

Passage débutant le 23.2 à Martigny, où beP signale un groupe de 32 ind. A Vouvy, l'espèce est présente à partir du 28.2 (15 ind; beP, rV), et les plus grands groupes signalés sont ceux de 82 ind le 2.3 et de 93 ind le 9.3 (rV). Mis à part ces deux sites, des troupes font également halte le 5.3 à Ardon (23 ind; beP), le 6.3 à Vétroz (6 ind; yCr), le 7.3 à Baltschieder (20 ind; Ker, Sal), les 22 et 27.3 à Leuk (20 puis 3 ind; F.-S. Meichtry; mBn) et le 28.3 à Turtmann (6 ind; Sal), date où le transit semble cesser.

BÉCASSEAU MINUTE, ZWERGSTRANDLÄUFER

2 le 3.6 à Vouvy (hDu, liM).

BÉCASSEAU DE TEMMINCK, TEMMINCKSTRANDLÄUFER

Egalement à Vouvy, 1 le 13.5 (hDu, jDp, L. Frutig).

BÉCASSEAU VARIABLE, ALPENSTRANDLÄUFER

Toujours à Vouvy, 1 le 2.3 (rV).

COMBATTANT VARIÉ, KAMPFLÄUFER

17 observations, dont 10 en provenance de Vouvy, réparties dans ce site entre le 28.3 (eRe) et le 13.5 (hDu, jDp, L. Frutig), et rapportant un max remarquable de 30 ind en escale le 8.5 (hDu). Les groupes de 15 ind le 8.5 à Martigny (hDu, beP) et de 12 ind le 9.4 à Leuk (hDu, liM) confirment un très bon passage; en dehors des 3 localités déjà citées, l'espèce est également mentionnée à Ardon le 18.4 (rA).


BÉCASSINE SOURDE, ZWERGSCHEPPE

Vue à Vouvy le 4.2 et le 6.3 (rV) ainsi qu'à Leuk le 21.4 (liM).

BÉCASSINE DES MARAIS, BEKASSINE

Première le 20.3 à Vionnaz (hDu), puis le 21.3 à Charrat





Femelle de Faucon kobez (à gauche) et mâle de Faucon crécerellette (à droite). Vouvry, mai 1999.

AQUARELLES: JÉRÔME FOURNIER

(beP, eRe). Bien présente du 22.3 au 24.5 (date très tardive) dans les champs inondés de Vouvry, avec notamment une dizaine d'ind le 19.4 et 7 le 24.4 (beP; eRe). Ailleurs, isolées également vues le 25.3 à Collombey-Muraz (rV), le 11.4, le 18.4 et le 8.5 à Martigny (beP; hDu) et le 22.4 à Agarn (K. Eigenheer, eRe).

BÉCASSE, WALDSCHNEPPE

2 le 20.3 à Varen (aSi).

BARGE À QUEUE NOIRE, UFFERSCHNEPPE

Une, particulièrement tardive, les 10 et 11.6 à Vouvry (hDu, jmD; liM).

COURLIS CORLIEU, REGENBRACHVOGEL

Un ind le 21.4 à Vouvry (liM).

COURLIS CENDRÉ, GROSSER BRACHVOGEL

A Vouvry uniquement, 2 le 26.3 et 1 le 18.4 (beP; nJ).

CHEVALIER GAMBETTE, ROTSCHENKEL

Migrateurs isolés signalés à Fully les 9 et 11.4 (rA) ainsi qu'à Vouvry les 18-19.4 et les 19-21.5 (liM, beP; hDu, rV).

CHEVALIER ABOYEUR, GRÜNSCHENKEL

6 observations en provenance de Vouvry étalées entre le 11.4 (beP, eRe) et le 16.5 (jmD, hDu), dont un max de 5 ind les 18-19.4 (liM, beP). Ailleurs, isolés le 14.4 à Martigny (beP) et le 17.4 à Grône (Rey).

CHEVALIER CULBLANC, WALDWASSERLÄUFER

28 observations dans 7 localités différentes, et comprises entre le 18.3 à Vouvry et le 20.5 au même endroit (rV).

CHEVALIER SYLVAIN, BRUCHWASSERLÄUFER

Mentionné entre le 8.4 à Vouvry (hDu, liM) et le 23.5 à Leuk (jDp). La grande majorité des observations sont de la première localité citée, où le passage maximal est remarqué les 8-9.5 avec une trentaine d'ind en escale (hDu, rV), et où l'on note également 12 ind le 29.4 (rV). En dehors de ce véritable pôle cantonal pour les limicoles, l'espèce est aussi observée à Grône (beP, Rey, aSi), Sierre, Salgesch (Rey) et Martigny (notamment 5 ind le 8.5; hDu, beP).

CHEVALIER GUIGNETTE, FLUSSUFERLÄUFER

Premier le 17.4 à Visp (Ker), puis vu régulièrement entre Martigny et Leuk jusqu'à fin mai, avec un max de 8 ind (en partie des nicheurs certainement) le 10.5 à Finges (M. Roost). En altitude, des cris dans la tempête sont perçus par aSi le 6.5 sur Crans-Montana, 2100 m.

GRAND LABBE, SKUA

Comme en 1998, observations printanières d'un «locataire» du Léman au Bouveret: les 25-27.4 et le 7.5 (hDu; CAVS).

MOUETTE MÉLANOCÉPHALE, SCHWARZKOPFMÖWE

Au Bouveret, 6 observations du 4.4 au 4.5, puis une erratique le 6.7 (jmD, hDu).

MOUETTE RIEUSE, LACHMÖWE

Seulement 7 observations entre le 11.2 à Martigny (beP) et le 27.6 à Leuk (Rey); cette dernière mention, ainsi que celle de 3 ind le 21.6 à Conthey (jeF), concernent très probablement des ind non nicheurs en erratisme.

GOÉLAND CENDRÉ, STURMMÖWE

Des retardataires signalés durant la dernière décade mai: 2 le 20.5 au Bouveret (jmD, hDu) et 1 les 25 et 28.5 à Vouvry (rV).

GOÉLAND BRUN, HERINGSMÖWE

Isolés mentionnés à Vouvry le 19.4 (beP), le 10.5 (jmD) et le 16.5 (hDu), ainsi qu'au Bouveret les 7 et 18.5 (hDu). Notons un erratique ou estivant le 6.7 au Bouveret (hDu).

GOÉLAND LEUCOPHÉE, WEISSKOPFMÖWE

rV note une présence quasi continue de l'espèce dans les champs du secteur Vionnaz-Illarsaz-Vouvry, de début mai jusqu'en automne. Bien que des groupes importants soient déjà vus à partir de fin mai (p. ex. 140 ind le 30.5), les plus grosses troupes sont vues durant le mois d'août, soit au maximum traditionnel de l'arrivée sur le Léman des estivants en provenance du bassin méditerranéen (Winkler 1999): toujours plus de 100 ind entre le 8.8 et le 24.8, avec des pointes à 230-250 ind entre le 8.8 et le 12.8. En dehors de ce pôle lacustre, 1 ind en vol amont le 10.4 à Leuk (eRe), et 4 observations de juin: le 9 à Martigny (jeF), le 13 sur le Rhône de Collonges (eRe), le 14 à Saillon (jeF) et le 28 à Conthey (aSi).

STERNE PIERREGARIN, FLUSSSEESCHWALBE

L'espèce est vue au Bouveret entre le 22.4 et le 4.5; max de 43 ind le 30.4 (jmD, hDu).

GUIFETTE MOUSTAC, WEISSBARTSEESCHWALBE

Passage hors du commun en Valais: une les 7-8.5 à Martigny (hDu, beP, bV), 6 le 8.5 à Leuk (bPi, C. Schönbächler) et une le 18.5 à Conthey (G. Dändliker).

PIGEON COLOMBIN, HOHLTAUBE

Normalement, 12 le 15.3 à Leuk et 8 le lendemain à Turtmann (eRe), puis des attardés en avril et des erratiques en mai: 2 le 8.4 à Vionnaz (rV), 1 les 10 et 19.4 à Leuk (eRe), 1 le 24.4 et le 11.5 à Martigny (bV; beP).

PIGEON RAMIER, RINGELTAUBE

A relever des rassemblements importants à Leuk: 550 le 26.3 puis 1500 le 28.3 (eRe; mPe).

TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE

Bien dans les temps, arrivée notée dans la troisième décade d'avril: première le 20.4 à Leuk (Rey), puis notons 7 ind le 24.4 à Martigny (bV). La migration est bien perceptible jusqu'au 7.6, date à laquelle des isolées sont encore signalées à Turtmann et Gampel (Rey; eRe).

COUCOU, KUCKUCK

Premiers ch le 23.4 à Salgesch (Rey) et Bürchen, 1400 m (A. Gattlen), puis mentionné très régulièrement durant la dernière semaine d'avril.

MARTINET NOIR, MAUSERSEGLER

Comme ailleurs en Suisse, 3 avant-coureurs exceptionnellement précoces le 29.3 à Grône (mPe), puis le 22.4 à Leuk et le 25.4 à Fully (eRe; beP).

MARTINET À VENTRE BLANC, ALPENSEGLER

Arrivée normale remarquée le 26.3 à Monthey et le 28.3 à Martigny (rV; beP).

MARTIN-PÊCHEUR, EISVOGEL

Le déplacement vers les territoires de nidification est perceptible entre le 7.2 à Martigny (beP) et le 31.3 à Collombey-Muraz (jcT).

HUPPE, WIEDEHOPF

Chante déjà le 17.3 à Fully (Anonyme par rA), puis une migratrice le 8.4 à Leuk (rA, eRe); les données ne se généralisent que dans la seconde moitié du mois d'avril.

TORCOL, WENDEHALS

Premier ch le 30.3 à Martigny (beP).

ALOUETTE CALANDRELLE, KURZZEHENLERCHE

La petite invasion constatée à l'échelle nationale est alimen-

tée de moitié par les données du Valais (MAUMARY & BAUDRAZ 2000). A Leuk, 8 observations (pour un total minimal de 3 ind) réparties entre le 21.4 (liM) et le 23.5 (M. Burkhardt); ailleurs, 2-3 ind du 7 au 9.5 à Martigny (beP et aI) et 2 le 16.5 à Fully (hDu, jmD); toutes ces données ont été acceptées par le CAVS.

ALOUETTE LULU, HEIDELERCHE

Retour le 26.2 Leuk (liM), puis 1 ind le 1.3 à Martigny (beP) et 2 le 29.3 à Sierre (Rey).

ALOUETTE DES CHAMPS, FELDLERCHE

Apparaît dans la dernière décade de février: les 20 et 26.2 à Collombey-Muraz (3 puis 85 ind; beP, rV), le 26.2 à Martigny (3 ind; beP) et le 27.2 à Ardon (25 ind; eRe).

HIRONDELLE DE RIVAGE, Uferschwalbe

Première le 7.4 à Martigny-Fully (hDu, liM), puis max de 20 le 24.4 à Martigny (bV), et 3 dernières le 23.5 au même endroit (hDu).

HIRONDELLE DE ROCHERS, FELSenschwalbe

Retour le 26.2 à Leuk (liM).

HIRONDELLE RUSTIQUE, RAUCHSCHWALBE

7 premières le 8.3 déjà à Conthey (yCr); les observations ne deviennent toutefois régulières qu'à partir du 16.3 à St-Léonard (mPe).

HIRONDELLE DE FENÊTRE, MEHLSCHWALBE

Arrivée dans les temps, le 28.3 à Grône (mPe).

PIPIT ROUSSELIN, BRACHPIEPER

A Vouvry, 1 le 21.4 (liM); à Martigny-Fully, 1 les 18 et 24.4 et 4 le 25.4 (liM; bV; hDu); à Leuk, observé 5 fois entre le 21.4 (liM) et le 9.5 (rGa), avec un max de 8 ind le 27.4 (adJ); enfin, à Gampel, 3 le 20.5 (beP).

PIPIT DES ARBRES, BAUMPIEPER

Migration perçue entre le 3.4 et le 16.5 à Martigny-Fully (beP).

PIPIT À GORGE ROUSSE, ROTKEHLPIEPER

Un le 4.5 à Vouvry (jmD, hDu).

PIPIT SPIONCELLE, BERGPPIEPER

Les neiges d'avril tombant en altitude repoussent de nombreux oiseaux jusqu'en plaine: 70 ind le 13.4 à Agarn (eRe), puis un min de 100 le 21.4 au même endroit (liM). Dernière observation de plaine, un le 8.5 à Martigny (bV).

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE, SCHAFSTELZE

Première très précoce le 7.3 à Raron (Sal), puis aucune mention jusqu'au 28.3 à Vionnaz (eRe); les plus grandes concentrations sont relevées dans la deuxième pentade de mai à Leuk-Agarn, avec un max d'une septantaine d'ind le 8.5 (bPi, C. Schönbächler). A noter 3 observations de la ssp *feld-degg* à Leuk-Agarn les 8, 14 et 23.5 (bPi et aI; beP, cId; I. Henry et aI), et la première mention documentée pour le pays de la ssp *iberiae* le 21.4 à Vouvry (liM); toutes les observations de ces 2 sous-espèces ont été homologuées par le CAVS.

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX, BERGSTELZE

Le 26.2, fort passage révélé par la présence d'une quinzaine d'ind au bord d'un canal à Martigny (beP).

ROSSIGNOL, NACHTIGALL

Avant-coureur extrêmement précoce le 31.3 à Fully (hDu, yFr; CAVS), puis normalement dès le 18.4 au même endroit (liM, beP).

GORGEBLEUE, BLAUKEHLCHEN

Bien vue ce printemps, avec un total de 6 ind: une le 1.4 à Grône (mPe), 2 le 4.4 à Martigny (beP) où il en reste une le lendemain, une le 8.4 à Leuk (rA, eRe) et, au même endroit, 2 différentes les 21 et 22.4 (liM; eRe).

ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ

De retour le 3.3 à Brig (H.-A. Schmid), le 5.3 à Sierre (rA) et le 13.3 à Martigny (beP).

ROUGEQUEUE À FRONT BLANC, GARTENROTSCHWANZ

Arrivée normale, le 4.4 à Martigny (beP); relevons un ch le 9.4 à Simplon, 1'400 m (Ph. Frei).

TARIEUR DES PRÉS, BRAUNKEHLCHEN

3 avant-coureurs le 1.4 déjà à Leuk (jcT), où l'espèce est à nouveau observée le 8.4 (rA, eRe). Il faut cependant



attendre la dernière décade du mois d'avril pour que le passage soit bien rapporté; notons 11 ind le 24.4 à Leuk (jDp) et 14 le 8.5 à Martigny (bV). Les derniers migrateurs semblent être observés le 27.5 à Collombey-Muraz (rV).

PÂTRE, SCHWARZKEHLCHEN

Retour de l'espèce remarqué le 26.2 à Vionnaz et Martigny (rV; beP) et le lendemain à Visp (Ker). A Leuk-Agarn, les mouvements semblent se terminer le 19.4 (eRe).

TRAQUET MOTTEUX, STEINSCHMÄTZER

Premier hâtif le 21.3 à Charrat (beP, eRe), puis notons un important rassemblement d'une cinquantaine d'ind le 21.4 à Leuk (liM); dernier en plaine le 16.5 à Leuk (G. Oesterhelt).

MONTICOLE DE ROCHE, STEINRÖTEL

Première mention le 24.4 à Erschmatt, 1'260 m (mBn).

MERLE À PLASTRON, RINGDROSSEL

2 ind observés en plaine, le 18.4 à Sierre (Rey).

GRIVE MUSICIENNE, SINGDROSSEL

Une quinzaine le 26.2 à Collombey-Muraz (rV), réapparition de l'espèce après presque 3 mois d'absence.

GRIVE MAUVIS, ROTDROSSEL

2 le 27.2 à Ardon (beP, eRe), 3 le lendemain à Sierre (mPe) et une le 1.3 à Martigny (beP).

LOCUSTELLE TACHETÉE, FELDCHWIRL

Régulièrement vue ou entendue entre le 21.4 à Grône (aSi) et le 24.5 à Geschinen, 1'360 m (siB), puis un ch erratique signalé à fin juin-début juillet à Gampel (eRe).

PHRAGMITE DES JONCS, SCHILFRÖHSÄNGER

Le 25.4, 2 ind (dont 1 ch) signalés à Martigny-Fully, et 1 ch à Ardon (hDu, beP).

ROUSSEROLLE VERDEROLLE, SUMPFRÖHSÄNGER

Ch dès le 11.5 à Martigny (beP), et n'arrive dans le Haut-Valais qu'à partir du 26.5 à Leuk (eRe).

ROUSSEROLLE EFFARVATTE, TEICHROHRSÄNGER

Dans les temps, le 25.4 à Ardon (beP).

ROUSSEROLLE TURDOÏDE, DROSSELROHSÄNGER

Uniquement en migration, les 8 et 20.5 à Leuk (rGa; dKr), le 9.5 à Saillon (rA) et les 16 et 20.5 à Martigny (beP).

HYPOLAIS ICTÉRINE, GELBSPÖTTER

Belle présence le 6.5 à Martigny, avec un total de 5 ind dont 4 ch (gCa, beP); l'espèce est mentionnée de ce même site les 11 et 13.5 (beP), et de Saillon le 16.5 (jeF).

FAUVETTE PASSERINETTE, WEISSBARTGRASMÜCKE

Un m le 26.4 à Fully (adJ, rBu; CAvS).

FAUVETTE BABILLARDE, KLAPPERGRASMÜCKE

Un ch hâtif le 4.4 à Vernayaz (jeF); la migration passe ensuite inaperçue jusqu'au début de la dernière décade d'avril, mais culmine très rapidement au cours de celle-ci: le 25.4, jour de «déblocage» météorologique, hDu compte un min de 29 ind dans la région du coude du Rhône entre Martigny et Fully, et le même jour des migratrices en escale sont également signalées de Riddes, Ardon (beP) et Sierre (Rey).

FAUVETTE GRISETTE, DORNGRASMÜCKE

La plus grande densité d'observations fait immédiatement suite au début de la migration: alors que l'espèce fait son apparition le 21.4 à Sierre (Rey), le 25.4 se révèle comme pour l'espèce précédente un jour faste, avec un total de 21 fauvettes entre Martigny et Fully (hDu), une à Dorénaz, une à Charrat (eRe), nombreuses à Riddes, min de 5 à Ardon (beP) et une à Brig (aSi).

FAUVETTE DES JARDINS, GARTENGRASMÜCKE

Premier chant le 1.5 à Sierre (aSi).

FAUVETTE À TÊTE NOIRE, MÖNCHSGRASMÜCKE

Dès le 14.3 à Ayent (aSi).

POUILLOT DE BONELLI, BERGLAUBSÄNGER

Arrivée normale le 24.4 à Fully et Leuk (jDp).

POUILLOT SIFFLEUR, WALDLAUBSÄNGER

Nombreux notés par beP le 25.4 à Riddes, jour où l'espèce est également signalée de Sierre (Rey).

POUILLOT VÉLOCE, ZILPZALP

De retour le 6.3 à Grône (aSi).

POUILLOT FITIS, FITIS

Ch hâtif le 19.3 à Vionnaz (nJ), et tardif le 16.5 à Bovernier (bV).

GOBEMOUCHE NAIN, ZWERGSCHNÄPPER

Un m le 25.4 à Fully (hDu, jMD, gCa, beP, G. Schuler; CAvS), constitue la première donnée pour le canton.

GOBEMOUCHE À COLLIER, HALSBANDSCHNÄPPER

Egalement un le 25.4 à Martigny (hDu, jMD; CAvS).

RÉMIZ, BEUTELMEISE

2 le 26.4 à Leuk (rBu).

LORIOT, PIROL

A partir du 25.4 à Martigny (beP).

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR, NEUNTÖTER

Arrivée perçue le 25.4 à Ardon et Martigny (beP; hDu) et le 1.5 à Leuk, Turtmann et Gampel (hDu, pjB); le plus gros du passage semble se dérouler entre le 11 et le 23.5, les deux fois à Martigny (13 puis 15 ind; beP; R. Aye).

PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE, ROTKOPFWÜRGER

Une le 12.5 à Gampel (eRe), et, le lendemain, une à Leuk et une à Fully (dKr, G. Oesterhelt; rA).

CHOCARD, ALPENDOHL

Encore 3 mentions de plaine dans la première moitié de mai: le 3.5 à Sierre (pjB) et les 9 et 11.5 à Leuk (bPi; M. Roost).

CORBEAU FREUX, SAATKRÄHE

Une seule observation, au début de la période de migration: 6 ind le 20.2 à Collombey-Muraz (beP, eRe).

CORNEILLE MANTELÉE, NEBELKRÄHE

En aval de la région sierroise, ind «purs» ou hybrides le 13.3, le 13.4, le 23.6 et le 3.8 à Martigny (beP, Ph. Baumann), le 17.4 à Collombey-Muraz (eRe) et le 7.5 à Riddes (jeF).

PINSON DU NORD, BERGFINK

Isolés les 7 et 14.3 à Montana, 1'250 m, le 18.3 à Brig (aSi) et le 23.3 à Martigny (beP).

VENTURON, ZITRONENGIRLITZ

Suite à des chutes de neige en altitude, un le 19.4 à Salgesch, 530 m (Ga).

LINOTTE, HÄNFLING

Encore une grande troupe de migratrices en mai: environ 120 le 8.5 à Leuk (C. Schönbachler), puis l'effectif s'effondre pour tomber à 20 ind le 12.5 (dKr).

BRUANT ORTOLAN, ORTOLAN

5 premiers le 21.4 à Agarn-Leuk (liM), où l'on en compte déjà 20 le 26.4 (rBu); chante déjà le 28.4 à Zermatt, 1'620 m (moJ, jS). Les seules données hors Haut-Valais proviennent de Collombey-Muraz (3 le 25.4; rV) et de Martigny (1 le 6.5; gCa).

BRUANT DES ROSEAUX

Net retour le 27.2 à Ardon, avec une quinzaine d'ind (beP).

BRUANT PROYER, GRAUAMMER

Premier le 15.3 à Leuk (eRe); relevons par la suite des isolés le 23.3 et le 7.4 à Martigny (beP; liM) et le 22.4 à Vouvry (hDu, liM).

INDICES DE NIDIFICATION 1999 BRUTNACHWEISE 1999

Les conditions maussades du printemps se prolongèrent encore jusqu'à la fin juin, rendant la vie bien difficile à certains nicheurs, comme la **HUPPE** et le **TARIER PÂTRE**, qui connurent des succès de reproduction médiocres. L'invasion de **RÂLES DES GENÊTS** rapportée en maints endroits du pays n'eut aucun écho valaisan, peut-être par manque de prospection. Pour ce qui est des nouvelles positives, le **FULIGULE MORILLON** se reproduisit pour la première fois dans le canton (lac excepté), les petites populations de **CHEVALIER GUIGNETTE** et de **PETIT GRAVELOTT** se

portent bien sur le Rhône de Finges, et la **PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE** fut à nouveau signalée nicheuse, après quatre années d'absence.

Die misslichen Bedingungen des Frühjahrs hielten noch bis Ende Juni an. Dies machte gewissen Brutvögeln wie etwa dem **WIEDEHOPF** und dem **SCHWARZKEHLCHEN** das Leben schwer; deren Bruterfolge fielen denn auch mitelmässig aus. Der Einflug des **WACHTELKÖNIGS**, der an vielen Stellen des Landes erfolgte, blieb im Wallis unbemerkt – vielleicht weil man nicht genügend Ausschau hielt. Unter den erfreulichen Neuigkeiten sind die erste Brut der **REIHERENTE** im Kanton (ausserhalb des Genfersees), die sich gut haltenden Populationen des **FLUSSUFERLÄUFERS** und des **FLUSSREGENPFEIFERS** am Rotten im Pfynwald sowie der **ROTKOPFWÜRGER** besonders erwähnenswert. Letzterer wurde nach vier Jahren Abwesenheit wieder als Brutvogel gemeldet.



118 • 2000
Page 76

GRÈBE CASTAGNEUX, ZWERGTAUCHER

Nidifications certaines enregistrées à Vionnaz (nJ, Cl. Rey, eS), Grône, Leuk (Rey) et Martigny, où beP signale un c ayant élevé 3 nichées. Ailleurs, un m ch le 13.6 à Sion (aSi).

GRÈBE HUPPÉ, HAUBENTAUCHER

Comme en 1998, reproduction signalée à Collombey-Muraz (rV).

BLONGIOS NAIN, ZWERGDOMMEL

Nidification certaine à Leuk, où un m ravitaile 5 poussins le 24.6 (beP), et à Sierre (Rey); reproduction possible à Grône (Rey) et à Finges (beP).

CANARD CHIPEAU, SCHNATTERENTE

Un c le 23.5 au Bouveret (hDu) et un le 4.6 à Grône (Rey), apparemment sans indices sérieux de nidification.

FULIGULE MORILLON, REIHERENTE

Première nidification de l'espèce dans le canton, région lacustre exceptée: un c produit 8 jeunes à Grône (R. Hauri, Rey, aSi).

BONDÉE APIVORE, WESPENBUSSARD

Signalée tout au long de la vallée du Rhône, de Vouvry (nJ) à Mund (mBn).

MILAN NOIR, SCHWARZMILAN

Jamais mentionné en amont de Leuk.

EPERVIER D'EUROPE, SPERBER

Relevons en altitude un comportement nuptial observé le 20.6 à Riederalp, 2300 m (Y. Schaerer).

FAUCON HOBEREAU, BAUMFALKE

Reproduction probable à Vionnaz (rV, eS), et 1-2 ind observés en avril-mai à Vouvry (div. obs.), sans indice sérieux de nidification toutefois.

FAUCON PÉLERIN, WANDERFALKE

Mentionné de Port-Valais (yCr) à Brig (aSi) en 24 localités, généralement en-dessous de 1'500 m. Les mentions qui s'écartent un tant soit peu du sillon rhodanien proviennent de Tanay/Vouvry (P. Albrecht), de Bretolet/Champéry (div. obs.), de Trient (eRe) et de Visperterminen (Ph. Frei).

PERDRIX BARTAVELLE, STEINHUHN

Chante entre 1530 m (le 17.5 à Erschmatt; mBn) et 3000 m (vers le 10.7 sur Zermatt; L. Lückler).

CAILLE DES BLÉS, WACHTEL

Signalée principalement dans la plaine haut-valaisanne: notons des max de 6 ch le 10.5 à Leuk (M. Roost), de 4 ch le 23.6 à Turtmann (Rey) et de 3 ch les 25 et 28.5 à Gampel (eRe; K. Eigenheer); toujours dans le Haut-Valais, relevons en altitude 5 ch le 3.7 à Geschinen (siB), 1360 m, ainsi qu'un très élevé le 2.7 à Albinen, 2200 m (H.-R. Kunz). Plus bas dans la

vallée, l'espèce est également entendue le 16.5 et le 3.7 à Montana, 1160 m (aSi), le 11.7 à Evolène, 1670 m (Ga), le 2.6 à Grimsuat, 930 m (aSi), ainsi qu'en plaine les 3 et 7.6 à Vétroz (beP; rA), le 11.5, le 16.5 et le 2.6 à Martigny (beP; jeF), et du 22 au 24.5 à Vouvry (eRe; hDu, liM), cette dernière mention étant à n'en pas douter celle d'une migratrice.

RÂLE D'EAU, WASSERRALLE

Ch entendus à Vionnaz (liM, jCT), Ardon (beP), Sierre et Finges (Rey).

GALLINULE POULE-D'EAU, TEICHHUHN

Nidification notée à Vionnaz (Cl. Rey), Martigny (beP), Grône, Finges (Rey) et Leuk (div. obs.); indices à Saillon (hDu, beP).

FOULQUE MACROULE, BLÄSSHUHN

Au moins 2 familles à Vionnaz (nJ, Cl. Rey, jCT), également nicheuse à Martigny (clD, beP) et Leuk (beP); nidification possible à Fully et Conthey (beP).

PETIT GRAVELOT, FLUSSREGENPFEIFER

Un recensement exhaustif sur le Rhône de Finges donne de très bons résultats: 10 territoires, contre 8 lors du dernier exercice équivalent, en 1995 (aLu).

VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ

Mis à part le vol de parade – sans suite concrète – d'un m le 21.3 dans des champs inondés de Martigny (beP, eRe), uniquement signalé de Vouvry, où l'érosion des effectifs semble se poursuivre: seulement 2 c, dont les tentatives de nidification ont très probablement échoué (div. obs.).

BÉCASSE, WALDSCHNEPPE

Croule entendue en 6 endroits distincts du Bois de Finges entre Salgesch et Leuk (div. obs.), sur Collombey-Muraz, 800 m (fE), le 16.6 dans le val Ferret, 1850 m (beP), et le 11.6 à Salvan, 1440 m (nJ), apparemment un nouveau site.

CHEVALIER GUINETTE, FLUSSUFERLÄUFER

A Finges, excellent total de 12 territoires déduits d'un recensement complet, contre 10 en 1995 (aLu). Hors ce lieu traditionnel, deux observations de l'espèce à début juin traduisent peut-être des tentatives d'installation: le 8.6 à Leuk (eRe) et le 10.6 à Riddes (jeF).

PIGEON COLOMBIN, HOHLTAUBE

Un ind le 27.5 à Vouvry (hDu), nicheur potentiel?

TOURTERELLE TURQUE, TÜRKENTAUBE

Toujours signalée à Zermatt, 1'620 m (moJ, jS).

TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE

Chante à Grône le 9.5 (Rey), à Vouvry le 24.5 (liM), à Leuk les 16, 26 et 28.5 (jCT; pWa; aLu), à Saillon le 2.5 et les 18-27.6 (beP, aSi) et à Salgesch le 13.7 (aSi).

COUCOU, KUCKUCK

Ch le plus élevé entendu le 26.6 à Bagnes, 2200 m (mKa).

EFFRAIE, SCHLEIEREULE

Une chouette vue le 4.3 à Saxon (yCr), seule mention de l'espèce en période de nidification.

PETIT-DUC, ZWERGHOEULE

3 c cantonnés entre Arbaz et Chermignon, dont 2 produisent un total de 10 jeunes à l'envol, un ch à Vex (rA, aSi), un ch à Lalden entendu du 10 au 23.5 ainsi que le 20.6 (G. Wyer), et un ch le 28.5 dans les peupliers d'Italie entre Agarn et Turtmann (P. Oggier).

GRAND-DUC, UHU

4 sites répertoriés dans la plaine du Rhône, dont 2 avec nidification certaine. Aucune donnée de montagne.

HIBOU MOYEN-DUC, WALDOHREULE

Une nidification certaine signalée à Collombey-Muraz (eS).

CHOUETTE DE TENGMALM, RAUHFUSSKAUZ

Ch signalés à Simplon, 1600 m (Ph. Frei), Geschinen, 1360 m (siB), Orsières, 1500 m (A., L. & P. Volet), et Icogne, 1960 m (aSi), site bien élevé, de même que Leukerbad, 2000 m, où mGe observe un ind le 31.5.

ENGOULEVENT, ZIEGENMELKER

1 m solitaire sur Fully (beP), 1 ch à Saint-Léonard, 3 ch à Lens

(aSi), puis ch signalés en 8 points du Bois de Finges ou du coteau entre Sierre et Turtmann, et, plus en amont, à Raron (Sal) et Visp (F.-S. Meichtry).

MARTIN-PÊCHEUR, EISVOGEL

Aucun indice de nidification.

GUÉPIER, BIENNFRESSER

2 le 7.5 à Turtmann (pjB) et 1 le 9.5 à Gampel (rGa, frN, beP), puis plus rien dans ce secteur. Par la suite, présence en juin en un autre site du Haut-Valais (Ker par rlm) et cris entendus le 30.7 près de la gare de Sierre (J. Jeanmonod), mais aucune preuve de reproduction.

HUPPE, WIEDEHOPF

Nidification possible ou certaine en 17 localités de la vallée du Rhône entre Fully et Visp. Dans le secteur d'étude de Fully-Saillon, les années se suivent et ne se ressemblent pas: les 9 couples cantonnés, tous établis dans des nichoirs en bâtiments, ont connu un succès reproducteur calamiteux, en raison des (très) mauvaises conditions météorologiques: seuls 26% des œufs pondus ont pu éclore, et la productivité totale ne s'élève qu'à 16 jeunes à l'envol (ARLETTAZ, R., J. FOURNIER, B. POSSE, A. SIERRO & N. ZBINDEN 2000).

TORCOL, WENDEHALS

En dehors du secteur Martigny-Brig, ch le 28.6 à Collombey-Muraz (jcT) et, dans la vallée de Conches, le 24.5 à Geschinen et le 13.6 à Münster (siB). En altitude, 2 ch très élevés entendus le 10.7 sur Zermatt, 2300 m (L. Lückert); avec cette dernière localité, Evolène regroupe les seuls indices de nidification pour les vallées latérales: 1 ch le 22.5 à 2030 m et 1 le 12.6 à 1760 m (mTh; Ga). Comme autre mentions élevées, retenons également 1 ch le 10.5 à Randogne, 1980 m (beP) et 1 le même jour à Guttet, 1800 m (rGa).

PIC VERT, GRÜNSPECHT

Indice de reproduction le plus élevé, chante sur Zermatt à l'altitude de 2300 m (moJ, jS).

PIC ÉPEICHETTE, KLEINSPECHT

Signalé à Collombey-Muraz, Collonges, Martigny, Saillon, Hérémente, Grône, Montana, Finges et Brig.

ALOUETTE LULU, HEIDELERCHE

Hormis un ch en avril à Nendaz (jcP), les données sont exclusivement concentrées entre Sierre et le Vispéral, d'où proviennent d'ailleurs les mentions les plus élevées: chante le 25.4 à Zeneggen, 1'500 m (Sal) et le 9.7 à Törbel, 2060 m (jcT), là-même où aSi signale une famille le 15.7.

ALOUETTE DES CHAMPS, FELDIERCHE

En plusieurs sites, ch entendus à des altitudes élevées: le 26.6 sur Bourg-St-Pierre, 2450 m (rLu), le 30.6 et le 6.7 sur Evolène, 2500 et 2530 m (jeF), ainsi que durant la saison de nidification sur Zermatt, 2700 m (moJ, jS).

HIRONDELLE DE ROCHERS, FELSENSCHWALBE

Un site de reproduction très inhabituel: 2 c construisent leurs nids sous une cabine de téléphérique Betten-Bettmeralp; le 27.6, ils nourrissent leurs jeunes alors que le téléphérique est en marche (pBs)!

HIRONDELLE DE FENÊTRE, MEHLSCHWALBE

Nidification très élevée sur un restaurant de Zermatt, 2580 m (moJ, jS).

PIPET ROUSSELINE, BRACHPIEPER

1 c vu à 2 reprises à Raron, le 1.5 et le 16.5, mais qui ne sera plus revu par la suite (Sal).

PIPET DES ARBRES, BAUMPIEPER


3 ch entendus au-dessous de 1000 m: le 17.4 à Brig, 750 m, le 5.5 à Lens, 860 m (aSi) et le 9.5 à Leuk, 900 m (rGa).

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE, SCHAFSTELZE

Toujours la petite population du Haut-Valais, avec des ind cantonnés signalés à Turtmann et Gampel (div. obs.), mais également quelques territoires dans le Chablais, à Vouvry (4 c; beP, rV) et Collombey-Muraz (1 c; eS).

BERGERONNETTE GRISE, BACHSTELZE

2 mentions au-dessus de 2000 m: une le 9.5 à Randogne,



Rougequeue à front blanc, (Gartenrotschwaz).

DESSIN DE JÉRÔME FOURNIER

2260 m (beP), et le traditionnel c nichant sur un restaurant de Zermatt, 2580 m (moJ, jS).

CINCLE, WASSERAMSEL

Plus haute donnée, un ind le 24.6 sur Saint-Luc, 2500 m (aSi).

ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE

Signalé entre 1900 m le 11.7 sur Vouvry (liM) et 3260 m le 4.4 sur Ayer (yFr).

ROSSIGNOL, NACHTIGALL

Chante tout au long de l'axe rhodanien, de Vouvry à Raron; jamais au-dessus de 800 m (le 12.5 à Varen; rGa), ni dans les vallées latérales.

ROUGEQUEUE À FRONT BLANC, GARTENROTSCHWAZ

En dehors de la zone comprise entre Fully et Eggerberg, ch entendus à Vouvry (D. Ebutt), Vernayaz (jeF), Simplon (Ph. Frei) et Münster, où un m imite un Roselin le 19.6 (U. Glutz von Blotzheim). En altitude, notons un ch le 10.5 à Randogne, 1980 m (beP).

TARIER DES PRÉS, BRAUNKEHLCHEN

Les seuls ch de plaine sont signalés de Leuk, Turtmann, Gampel et Raron. Mentions les plus en aval: ch le 20.6 sur Vouvry, 2000 m (J. Trub) et le 16.6 à Issert/Orsières, 1190 m (beP); mention la plus élevée, un ch le 30.6 sur Evolène, 2'400 m (jeF).

PÂTRE, SCHWARZKEHLCHEN

Dans la plaine haut-valaisanne, où l'espèce est signalée jusqu'à Brig, min de 35 territoires entre Leuk et Gampel (eRe); une étude menée sur cette population révèle un succès reproducteur moyen de 2.7 jeunes émancipés par c, bilan médiocre attribuable en partie au temps particulièrement maussade ayant régné d'avril à juin (eRe). Dans le Bas-Valais, 1 territoire à Port-Valais (nJ), 5-6 entre Vouvry et Collombey-Muraz (div. obs.), 6 dans la plaine de Collonges et Dorénaz (nJ, eRe) et 9 à 12 sur la commune de Martigny (beP, eRe); dans le centre, des c sont également signalés à Ardon (beP), Sion (div. obs.), St-Léonard et Chalais (aSi). Au chapitre des particularités, relevons une nidification sur le coteau du Rosel/Dorénaz (J.-M. Pillet, beP), événement qui ne s'était plus produit depuis bien des années, ainsi que la présence très élevée d'un ind le 3.6 à Bratsch, 1600 m (mGe).

MONTICOLE DE ROCHE, STEINRÖTEL

Par rapport à l'année passée, signalé en montagne dans le val Ferret/Orsières (T. Sattler), sur Sarreyer/Bagnes (mKa), et, dans le Haut-Valais, sur Visperterminen (Ph. Frei), Simplon (P. Blaser), Riederalp (Y. Schaefer), Betten (pBs), Ried-Brig (T.-O. Schwaller) et Oberwald (T. Sattler). 2 mentions pour le bas-coteau, le 8.5 et le 12.6 à Leuk (H.-R. Kälin; E. Lampérth).

ROUSSEROLLE VERDEROLLE, SUMPFRÖHRSÄNGER

Le 3.7, beP compte jusqu'à 4 ch sur un ha de vernes, au-dessus de Bourg-St-Pierre, 1700 m; le 4.7, un ch entendu dans une mégaphorbiée à Ferret/Orsières, 1900 m (T. Sattler).

ROUSSEROLLE EFFARVATTE, TEICHROHRSÄNGER

A relever 5 territoires comptés aux Rigoles de Vionnaz le 22.5 (nj).

HYPOLAÏS POLYGLOTTE, ORPHEUSSPÖTTER

Prioritairement du coteau entre Leuk et Ausserberg, mais également de Martigny (beP), Fully (hDu, beP), Saillon (jeF), Ardon (beP), Grimsuat (aSi) et Grône (Rey).

FAUVETTE BABILLARDE, KLAPPERGRASMÜCKE

Grande majorité des données réparties entre 1500 et 2300 m; notons que le 24.5, jcT compte 17 ch sur 9 km² au-dessus de Zermatt, entre 2000 et 2300 m. A basse altitude, ch entendus sur les coteaux de Leuk, 800-900 m (rA, F. Kurz, pWa) et de Fully, 560 et 680 m (hDu; jeF).

FAUVETTE GRISETTE, DORNGRASMÜCKE

Seuls indices sérieux, chante en mai sur le coteau de Leuk, 950 m (dKr) ainsi que le 18.6 à Saillon (aSi). En outre, relevons la présence extrêmement élevée d'un ch le 6.7 sur Zermatt, 2150 m (L. Lückert).

FAUVETTE À TÊTE NOIRE, MÖNCHSGRASMÜCKE

En montagne, chante le 5.7 sur Mollens, 1900 m (Rey) et le 17.7 à Salanfe/Evionnaz, 1900 m (beP).

POUILLOT DE BONELLI, BERGLAUBSÄNGER

De Martigny à Geschinen, de la plaine jusqu'à 2000 m.

POUILLOT SIFFLEUR, WALDLAUBSÄNGER

Une dizaine de territoires à Finges, 1 ch le 26.5 à Chermignon, 990 m (Rey) et 1 le 7.5 à Lens (aSi).

TICHODROME, MAUERLÄUFER

Le site de nidification le moins élevé est celui des gorges du Feschelbach/Leuk, 900 m (div. obs.). Plus en altitude, un c fourrageant le 29.6 sur Savièse, 1850 m (C. Balzari), et mentions provenant également d'Icogne, 1700 m (Rey), d'Orsières, 1'950 m (T. Sattler), de Simplon, 1200 m (eRe) et de Zermatt, 1720 et 2050 m (E. Bernardi; K. Eigenheer, mol, jS). Dans ce dernier site, un c installe son nid dans une anfractuosité de façade d'une usine: c'est apparemment le premier cas de nidification sur un bâtiment enregistré en Suisse depuis plusieurs décennies (Hauri in Schmid et al 1998).

LORIOT, PIROL

Ch entendus à Vouvry (hDu), Vionnaz (eS, jcT), Collombey-Muraz (jeF), Riddes (jeF), St-Léonard, Sierre, Salgesch (Rey), Leuk, Turtmann (div. obs), Gampel (eRe) et Steg (Rey).

PIE-GRÎCHE ÉCORCHEUR, NEUNTÖTER

Le long de l'axe rhodanien jusqu'à Geschinen et dans les vallées latérales. Les rares nicheurs de plaine sont signalés à Vionnaz (rV), Conthey (rA), Sierre (Rey), puis entre Leuk et Raron (div. obs.); en altitude jusqu'à 2000 à Betten (pBs).

PIE-GRÎCHE À TÊTE ROUSSE, ROTKOPFWÜRGER

Premières preuves de reproduction dans le canton depuis 1995: 2 c nicheurs dans le Haut-Valais.

PIE BAVARDE, ELSTER

Une nidification certaine particulièrement élevée est notée le 27.6 sur Ried-Mörel, 2050 m (pBs).

CHOUCAS, DOHLE

Parmi le peu de mentions, retenons un m ch le 9.3 en ville de Sion (aSi).

MOINEAU CISALPIN, ITALIENSERLING

Rencontré à Martigny le 30.7 (beP), Sion le 14.6 (Rey),

Evolène le 12.6 et le 31.7 (mTh; Ga), Brig le 9.7 (K. & L. Felix) et à Sierre régulièrement (Rey).

NIVEROLLE, SCHNEESPERLING

Relevons une trentaine d'ind le 11.7 dans la région des Cornettes de Bise/Vouvry, 1900 m (liM), en bordure de l'aire de répartition de l'espèce dans les Alpes.

VENTURON, ZITRONENGIRLITZ

Un ch élevé le 26.6 à Bagnes, 2250 m (mKa).

CHARDONNET, DISTELFINK

Là aussi, un indice de nidification élevée: un c le 10.5 à Randogne, 1960 m (beP).

LINOTTE, HÄNFLING

Chante le 30.6 sur Evolène, 2380 m (jeF).

SIZERIN, BIRKENZEISIG

En plaine, présence remarquée à Martigny, Fully et Saillon (hDu, liM, beP).

ROSELIN, KARMINGIMPEL

2 ch dans la vallée de Conches: un le 13.6 à Geschinen (siB) et un autre le 19.6 à Reckingen (U. Glutz von Blotzheim).

GROSBEK, KERNEISSER

Les mœurs de l'espèce sont décidément bien discrètes: une mention le 4.4 à St-Maurice (eRe), 4 mentions de mai en 2 sites de Leuk (rGa, G. Oesterheld, pWa), et c'est tout!

BRUANT ZIZI, ZAUNAMMER

En dehors de la zone comprise entre Sierre et Ausserberg, présence comme à l'accoutumée bien disséminée: 1 c le 18.3 à Icogne, 1050 m (aSi), 1-2 ch le 15.6 à Lens, 1200 m (gCa), 1 le 4.7 à Fully (beP), 1 le 25.6 à Vernayaz (jeF), 1 le 27.2 et le 29.3 à Dorénaz (jeF; jcT) et 1 le 7.5 à Monthey, 500 m (jeF), site inédit?

BRUANT FOU, ZIPPAMMER

Jusqu'à Binn et Geschinen (siB, jcT).

BRUANT ORTOLAN, ORTOLAN

Uniquement du Haut-Valais entre Leuk et Ausserberg, avec en plus un ch à Zermatt, 1620 m (mol, jS); 6-7 ch de plaine entre Leuk et Gampel, le long de la voie ferrée ou le long des meunières (eRe).

BRUANT PROYER, GRAUAMMER


1-3 ch à Leuk-Turtmann (div. obs.), et un ind vu le 23.5 à Sion (aSi).

L'AUTOMNE 1999 • HERBST 1999

Septembre et octobre furent nettement plus chauds que la moyenne (+ 3,5 °C), mais l'hiver fit brutalement son apparition dès la mi-novembre. Parmi les différents mouvements de fuite hivernale alors relevés dans l'ensemble du pays, le transit du **VANNEAU** fut celui qui trouva le meilleur écho dans notre canton; le fort passage de **GRUES** également enregistré dans le reste de la Suisse fut aussi bien perceptible en Valais. Dans un autre registre, des excursions en montagne furent parfois l'occasion de rencontres surprenantes avec différents migrateurs en escale particulièrement élevée; c'est ainsi que des **SARCELLES D'HIVER**, des **HUPPES**, des **VANNEAUX HUPPÉS**, un **BÉCASSEAU COCORLI**, un **CHEVALIER CULBLANC**, une **Caille** ou une **POULE D'EAU** gratifièrent le décor alpin de leur présence souvent insolite... Enfin, une dernière spécialité à souligner: la première mention valaisanne du **PIPIET DE RICHARD**.

September und Oktober waren deutlich wärmer als üblich (+ 3,5 °C), doch der Winter machte ab Mitte November seine unsanfte Aufwartung. Bei den winterli-





Sizerin (Birkenzeisig). – Dessin de Jérôme Fournier

chen Fluchtbewegungen, die daraufhin im ganzen Land vermerkt wurden, war diejenige des **KIEBITZ** in unserem Kanton am auffälligsten. Der starke, landesweit bemerkte Durchzug des **KRANICHS** war auch im Wallis deutlich spürbar. Daneben ergaben Exkursionen im Gebirge manch-mal Beobachtungen von Zugvögeln, die in ungewöhnlicher Höhe rasteten: **KRICKENTEN**, **WIEDEHOPFE**, **KIEBITZE**, ein **SICHELSTRANDLÄUFER**, ein **WALDWASSERLÄUFER**, eine **WACHTEL** oder ein **TEICHHUHN** beehrten die alpine Bühne mit einem flüchtigen Auftritt. Schliesslich gilt es, eine letzte Besonderheit hervorzuheben: Der erste Nachweis des **SPORNIPIERS** für das Wallis.

GRAND CORMORAN, KORMORAN

Avant-coureur signalé le 28.7 à Salgesch (Rey), puis aucune donnée en août. A Monthey, rV comptabilise le total migratoire automnal le plus élevé depuis 1995: 6 983 oiseaux en provenance du Léman entreprennent le passage des Alpes du 4.9 au 7.12; le record journalier est également battu, avec un total impressionnant de 586 ind le 1.11. Dans le Haut-Valais, 20 ind en vol aval le 4.11 à Turtmann (aSi), 31 le 14.11 sur le Rhône à Raron (Ker, Sal) et 1 le 19.10 à Visp (aSi), donnée la plus en amont. Enfin, mention la plus élevée (hormis Bretolet): 4 ind le 10.10 dans le vallon de Réchy, 1800 m (jGr).

BLONGIOS NAIN, ZWERGDOMMEL

Dernier le 6.9 à Finges (B. Lugrin, beP).

BIHOREAU GRIS, NACHTREIHER

L'observation d'un ind franchissant le col de Bretolet le 3.9 (Anonyme) constitue l'unique donnée pour la saison.

HÉRON CENDRÉ, GRAUREIHER

En altitude, un migrateur le 12.7 au col du Gd-St-Bernard, 2450 m (bV) et un le 25.8 sur Ayent, 1780 m (Rey).

HÉRON POURPRÉ, PURPUREIHER

Un migrateur hâtif ou un erratique le 7.7 à Grône (Rey).

CIGOGNE NOIRE, SCHWARZSTORCH

A Bretolet uniquement: 3 le 17.9, 3 le 21.9 (pBs, jHa) et une le 9.10 (L. Jenni, frN, M. Schweizer).

CIGOGNE BLANCHE, WEISSSTORCH

Une le 31.8 à Vionnaz (M.-C. Reihle).

CANARD SIFFLEUR, PFEIFENTE

Le 28.10 à Sierre (Rey).

SARCELLE D'HIVER, KRICKENTE

Premiers mouvements décelés à Martigny le 4.8 (2 ind; beP), localité où l'espèce est régulièrement observée jusqu'au 20.10 (4 ind; beP), et signalée à Grône à partir du 2.9 (Rey). En dehors de ces deux pôles qui monopolisent la grande majorité des observations, vue le 27.8 sur Collombey-Muraz, 1600 m (2 ind; gCa), à Leuk le 22.10 (Rey), et sur Evolène le 26.8, à l'altitude étonnante de 2690 m (2 ind; mTh).

CANARD COLVERT, STOCKENTE

34 ind le 14.10 à Martigny (beP), plus grande troupe pour la saison.

CANARD PILET, SPIESENTE

Un le 29.9 à Martigny (beP).

SARCELLE D'ÉTÉ, KNÄKENTE

5 le 20.8 à Vouvy (rV), seule mention automnale.

CANARD SOUCHET, LÖFFELENTE

Un le 31.8 et les 4-6.9 à Martigny (beP), ainsi qu'un autre le 6.9 à Leuk (beP).

NETTE ROUSSE, KOLBENENTE

Une à Sierre le 20.9 (Rey).

BONDÉE APIVORE, WESPENBUSSARD

A Bretolet, le passage culmine entre le 15 et le 22.9; max atteint le 19.9 avec un total journalier remarquable de 101 ind (P. Rapin). Ailleurs en montagne, 2 migratrices le 5.9 sur Liddes, 2450 m (beP, eRe) et une le 11.9 à Trient, 1110 m (jDp). Dernière mention de plaine: une le 21.9 à Grône (Rey).

MILAN NOIR, SCHWARZMILAN

4 le 30.8 au col de Bretolet (eRe), où le dernier est observé le 23.9 (jHa); également en montagne, un le 19.9 à Balme/Trient, 2200 m (beP, eRe).

MILAN ROYAL, ROTMILAN

Vu à Bretolet entre le 9.9 et le 24.9 (jHa), puis à Evionnaz le 2.10 (nJ) et à Martigny le 2.10 (2 ind; eRe), le 16.10 (2 ind; beP) et le 17.10 (eRe).

GYPÆTE BARBU, BARTGEIER

Observations de 1-2 ind sur Champéry réparties entre le 4.9 (jCT) et le 17.10 (J.-J. Beley) et de 1-3 oiseaux (dont Crystal; rA) dans la région Emosson/Finhaut-Trient-Vallorcine. Par ailleurs, Veronika (PN 1999) est vue le 13.9 sur Ayent (rA), le 24.10 et le 7.11 sur Conthey (X. Petite, beP; jmGa), République 11 est signalé à fin novembre sur Chamoson-Conthey (D. Carrard, P. Dubois, F. Udry), et des observations d'individus non identifiés de façon sûre nous proviennent également des Cornettes de Bise/Vouvry (J.-M. Fel-Doriz), de Salanfe/Evionnaz (S. Gatouillat), de Fully (G. Granges, jGr, eRe), du Sanetsch/Savièse (gCa) et de Leukerbad (O. Jaquet, D. Roten).

BUSARD DES ROSEAUX, ROHRWEIHE

Mentionné dès le 28.8 à Collombey-Muraz (rV) et le 30.8 au col de Bretolet (2 ind; jGr, eRe), où le max journalier est atteint le 19.9 avec pas moins de 53 ind (jGr), et où l'espèce est signalée jusqu'au 10.10 (M. Schweizer). Ailleurs, 1 migrateur vu à Bavon/Liddes le 5.9 et 4 le 19.9 au col de Balme/Trient (beP, eRe).

BUSARD SAINT-MARTIN, KORNWEIHE

Migrateurs vus le 23.9 à St-Martin, 1660 m (Rey), le 9.10 à Bavon/Liddes, 2300 m (jCT), le 22.10 au col de Bretolet (mGe) et le 31.10 à Fully, 2280 m (beP). Dans le Chablais, l'espèce est présente à partir du 24.10 (rV).

BUSARD CENDRÉ, WIESENWEIHE

Toutes les observations proviennent de Bretolet: un ind franchit le col le 30.8 (jGr, eRe), 2 le 8.9 (pBs) et 1 le 15.9 (pBs, jHa).

EPERVIER D'EUROPE, SPERBER

Donnée la plus élevée, un migrateur le 5.9 à Bavon/Liddes, 2450 m (beP, eRe).

BUSE VARIABLE, MÅUSEBUSSARD

Fort passage le 9.10 au col de Bretolet, où une soixantaine de migratrices sont dénombrées.

BALBUZARD PÊCHEUR, FISCHADLER

A Collombey-Muraz, site peu ordinaire pour l'espèce, 1 le 26.8 (nJ) et un autre très tardif du 21.10 au 1.11 (nJ, eS, oTu, rV). En migration de montagne, un le 18.9 à Balme/Trient (rLu, S. Voisard) et total automnal de 34 rapaces au col de Bretolet (max de 9 ind le 18.9; pBs).

FAUCON CRÉCERELLE, TURMFALKE

Premier migrateur aperçu en montagne, le 5.9 à Bavon/Liddes, 2450 m (beP); à Bretolet, l'espèce n'est signalée qu'à partir du 11.9, et un passage maximal de 27 ind est enregistré le 19.9 (jHa).

FAUCON ÉMERILLON, MERLIN

Premier le 14.9 au col de Bretolet, puis un migrateur le 18.9 à Balme/Trient (rLu, S. Voisard). En plaine, aperçu le 5.10 à Martigny (beP), et présent à Vionnaz-Vouvry à partir du 21.10 (beP).

FAUCON HOBEREAU, BAUMFALKE

Passage perçu entre le 7.9 au col de Bretolet (jHa) et le 24.10 à Vouvry (2 ind; rV); dans le premier lieu nommé, le max journalier (9 ind) est atteint le 19.9, comme pour le Busard des roseaux, la Bondrée et le Faucon crécerelle. Des migrateurs sont mentionnés les 18-19.9 à Balme/Trient (1 puis 3 ind; rLu, S. Voisard; eRe), à Martigny le 30.9 et le 2.10 (beP; eRe) et à Collombey-Muraz le 10.10 (rV).

FAUCON PÉLERIN, WANDERFALKE

Un ind consommant une Mouette rieuse le 14.11 à Vouvry provoque la convoitise d'un Faucon émerillon (beP, eRe).

GÉLINOTTE, HASELHUHN

Le 13.11, 2 observations sur Bourg-Saint-Pierre, à 1800 m et 1940 m (jCT).

TÉTRAS LYRE, BIRKHUHN

2 m paraded le 10.10 à Riederalp, 2100 m (Y. Schaerer).

PERDRIX BARTAVELLE, STEINHUHN

10 ind le 13.11 sur Bourg-Saint-Pierre, 1990 m (jCT).

CAILLE DES BLÉS, WACHTEL

Une migratrice étonnante le 9.9 à la Fenêtre de Durand/Bagnes, 2730 m (P. Steg), et mention relativement tardive le 21.10 à Vouvry (beP).

RÂLE DES GENÊTS, WACHTELKÖNIG

Une capture le 4.9 au col de Bretolet (frN).

MARQUETTE PONCTUÉE, TÜPFELSUMPFUHN

Vue à 4 reprises à Martigny: le 19.8, le 18.9 (3 ind), le 21.9 et le 30.9 (beP); 3 fois dans les filets de Bretolet, le 27.8, le 9.9 et le 19.9 (frN).

GALLINULE POULE-D'EAU, TEICHHUHN

Observation insolite le 10.9 sur Liddes, 2500 m (P. Steg)!

GRUE CENDRÉE, KRANICH

Fait bien rare (probablement une première), 3 ou 4 groupes distincts signalés sur 2 semaines, à fin octobre-début novembre. Le 16.10 tout d'abord, une famille (2 ad et une jeune) en migration aval est repérée à Chamoson (rA); elles ne sont que 2 à se poser le soir même à Martigny, d'où elles repartent le lendemain (beP, eRe). Le 19.10 ensuite, une troupe d'une vingtaine d'ind en provenance du lac survole le terrain de football éclairé de Collombey-Muraz, en direction de Monthey (oTu); du 21 (rV et al) au 26.10 (jmF), 15 ind stationnent à Vionnaz. Le 1.11 enfin, des cris nocturnes sont entendus sur Collombey-Muraz (oTu).

PLUVIER DORÉ, GOLDBREGENPFIEFER

2 le 18.11 à Collombey-Muraz (jDp, liM, beP) puis un le 21.11 à Vouvry (eS).

VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ

Avant-coureurs sur le retour observés déjà en juin à Martigny-Fully: 1 ind le 6.6, 2 le 10.6 et 6 le 21.6 (hDu; aSi); autre mention estivale, celle de 2 ind en juin/juillet à Grächen, 2100 m (R. Manz). Le passage n'est toutefois vraiment perceptible qu'à partir de la mi-octobre: notons 27 ind

le 17.10 à Vouvry (rV) et un le même jour à Martigny (beP); les choses s'emballent en novembre, avec tout d'abord une cinquantaine d'ind le 4.11 à Leuk (Rey), puis, du 16 au 18.11, des groupes bloqués par la neige: une vingtaine au moins le 17.11 à Martigny (B. Murisier) et surtout un max de 420 ind le 18.11 à Vouvry (rV). Les derniers oiseaux sont signalés le 22.11 à Collombey-Muraz (4 ind; oTu).

BÉCASSEAU COCORLI, SICHELSTRANDLÄUFER

En escarpement alpin, un le 5.9 à Oberwald, 2170 m (F.-S. Meichtry).

BÉCASSEAU VARIABLE, ALPENSTRANDLÄUFER

Un oiseau le 16.9 à Martigny (beP).

COMBATTANT VARIÉ, KAMPFLÄUFER

Un les 25-27.8 à Vouvry (nJ; rV).

BÉCASSINE DES MARAIS, BEKASSINE

Presque toujours des isolées, le 2.8 à Leuk (eRe), le 8.8 et les 14-27.11 à Vionnaz (nJ), les 16.18 et 25.9 à Martigny (beP), les 3 et 23.10 à Vouvry (eS; beP) et le 14.10 à Conthey (P. Lüps).

COURLIS CORLIEU, REGENBRACHVOGEL

Un les 17 et 20.8 à Vouvry (rV, nJ).

COURLIS CENDRÉ, GROSSER BRACHVOGEL

2 ind stationnent à Vouvry du 20 au 27.8 (nJ, rV); quant aux 10 ind observés au même endroit le 31.10 (M. Barazategui), ils constituent un groupe conséquent pour le canton.

CHEVALIER GAMBETTE, ROTSCHEKEL

Des cris le 10.9 au col de Bretolet (pBs).

CHEVALIER CULBLANC, WALDWASSERLÄUFER

Passage timide. Des cris le 20.6 à Riddes (beP), un le 27.6 et 2 le 11.8 à Vouvry (rV), et 2 mentions de montagne: un ind le 5.8 à Derborence/Conthey, 1450 m (beP) et un autre le 13.8 sur Savièse, 2140 m (jCT).

CHEVALIER GUIGNETTE, FLUSSUFERLÄUFER

Mouvements de retour décelés le 29.7 à Baltschieder (Ker), le 5.8 à Derborence/Conthey, 1450 m (beP) et en août-septembre à Martigny (beP). Peut-être un début d'hivernage à Port-Valais: un oiseau vu le 16.10 et le 14.11 (G. Gilliéron).

MOUETTE RIEUSE, LACHMÖWE

Signes de véritable migration le 13.7 à Martigny (1 ind; beP) et Turtmann (18 ind; aSi). Plus loin dans la saison, relevons 15 ind le 4.11 à Leuk, 33 le 14.11 à Sierre (Rey) et 4 le même jour à Raron (Sal).

GOÉLAND CENDRÉ, STURMMÖWE

Hivernants en mouvement les 15 et 18.11 à Vouvry (3 puis 10 ind; eS; beP).

GOÉLAND BRUN, HERINGSMÖWE

Observation notable de 6 ind le 20.8 à Vouvry (rV), puis encore vu à 5 reprises dans la région jusqu'au 18.11 (beP, rV), avec un max de 3 ind le 16.9 (rV).

GOÉLAND LEUCOPHÉE, WEISSKOPFMÖWE

Dans les champs du Chablais, les effectifs sont les plus faibles durant le mois de septembre et la première moitié d'octobre, puis reprennent de l'importance à partir du 21.10; notons des max de 215 ind le 7.11 à Vionnaz et de 220 le 16.11 à Collombey-Muraz (rV).

GOÉLAND ARGENTÉ/LEUCOPHÉE, SILBER-/WEISSKOPFMÖWE

Ind en migration vus à Martigny-Combe le 12.9 et le 2.10 (beP, eRe) et à Bretolet le 15.9 (pBs).

PIGEON COLOMBIN, HOHLTAUBE

1-3 ind vus à Martigny à 5 reprises entre le 16.9 et le 17.10 (beP), et 1 le 19.9 au col de Bretolet (P. Rapin).

PIGEON RAMIER, RINGELTAUBE

Grands rassemblements signalés à Collombey-Muraz à des dates relativement hâtives: 300 ind le 22.8, puis 450 le 1.9 (rV).


TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE

3 observations d'isolées en provenance de Martigny: le 21.9 et, dates bien tardives, les 13 et 18.10 (beP).

COUCOU, KUCKUCK

Dernier le 6.9 à Leuk (beP).





Chouette de Tengmalm, (Rauhfußkauz). – Dessin de JÉRÔME FOURNIER

HIBOU MOYEN-DUC, WALDOHREULE

4 ind au dortoir le 14.11 à Raron (Sal).

CHOUETTE DE TENGMALM, RAUFUSSKAUZ

5 captures au col de Bretolet.

MARTINET NOIR, MAUSERGLER

3 mentions de la première décennie d'octobre: 3 le 2.10 à Monthey (rV), 1 le 3.10 à Martigny (beP) et 2 derniers le 6.10, à nouveau à Monthey (rV).

MARTINET À VENTRE BLANC, ALPENSEGLER

Dernière mention le 7.10 à Monthey (Ga).

MARTIN-PÊCHEUR, EISVOGEL

Réapparition dans le canton dès le 1.8 à Collombey-Muraz (eS), et relevons une capture au col de Bretolet le 3.9 (frN).

HUPPE, WIEDEHOPF

2 ind le 30.8 sur Ried bei Mörel, 2300 m (F. Manco, S. Marcacci).

PIC TRIDACTYLE, DREIZEHENSPECHT

Un m le 28.10 sur Martigny-Combe, 1660 m (eRe).

ALOUETTE LULU, HEIDELERCH

13 observations, du 30.9 à Martigny au 23.10 au même endroit (beP); max de 30 ind le 21.10 à Collombey-Muraz (rV).

HIRONDELLE RUSTIQUE, RAUSCHSCHWALBE

3 dernières le 26.10 à Martigny (beP).

PIPET DE RICHARD, SPORNIPIEPER

Un le 16.9 à Martigny (beP; CAVS): 6^e mention pour la Suisse, 1^{ère} valaisanne.

PIPET ROUSSELIN, BRACHPIEPER

Un ind complètement en dehors des dates vu le 10.7 sur Zermatt, 2300 m (L. Lückner); également en escale d'altitude, un ind le 5.9 sur Liddes, 2450 m (beP, eRe). Ailleurs, vu 2 fois au col de Bretolet, le 21.8 et le 9.9 (Journal de Bretolet), et 2 fois à Martigny, les 18 et 25.9 (beP).

PIPET DES ARBRES, BAUMPIEPER

Attardé le 18.10 à Martigny (beP).

PIPET FARLOUSE, WIESENPIEPER

A relever une troupe d'au moins 200 ind le 21.10 à Collombey-Muraz (rV).

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE, SCHAFSTELZE

2 dernières le 15.10 à Vouvry (eRe).

CINCLE, WASSERAMSEL

Notamment un le 16.10 sur Orsières, 2450 m (yFr).

ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE

Premier signe de transhumance le 25.11 à Lens, 820 m (aSi).

ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ

A noter un ind imitant un Pouillot véloce le 1.10 à Lens, et encore un ch le 16.11 au même endroit (aSi).

ROUGEQUEUE À FRONT BLANC, GARTENROTSCHWANZ

Ultime mention très tardive le 8.11 à Miège (Rey).

TARIER DES PRÉS, BRAUNKEHLCHEN

Entre autres, un migrateur le 12.10 sur Verbier, 2370 m (jcT), et dernier tardif le 30.10 à Martigny (beP).

PÂTRE, SCHWARZKEHLCHEN

Relevons un total de 21 ind en escale, le 16.10 dans les cultures et friches de Martigny (beP, eRe). Aucune donnée postérieure au 3.11 à Leuk (Rey).

TRAQUET MOTTEUX, STEINSCHMÄTZER

3 premiers en plaine le 11.8 à Vouvry (rV); les derniers migrants sont observés en montagne, le 17.10 sur Saxon, 2400 m (jcT) et le 20.10 sur Evolène, 2300 m (mTh).

GRIVE LITORNE, WACHOLDERDROSSEL

500 ind en migration le 18.11 à Collombey-Muraz (rV).

GRIVE MAUVIS, ROTDROSSEL

Une le 17.10 à Martigny (beP), 3 le 30.10 à Mund, 1400 m (aSi), une juv trouvée morte le 5.11 sur Collombey-Muraz, 1750 m (E. Bertouille) et 4 le 18.11 à Martigny (beP).

LOCUSTELLE TACHETÉE, FELDSCHWIRL

Une seule mention, un ind étourdi après avoir heurté une vitre, le 5.9 à Brig (aSi).

PHRAGMITE DES JONCS, SCHILFROHRSÄNGER

Vu à Grône le 7.9 (aSi), et à Martigny à 5 reprises entre le 20.8 et le 29.9 (beP, eRe).

ROUSSEROLLE EFFARVATTE, TEICHROHRSÄNGER

Observations tardives les 20 et 26.10 à Martigny (beP).

FAUVETTE BABILLARDE, KLAPPERGRASMÜCKE

Ultimes données le 19.9: 4 à Bretolet et une à Grône (pBs; Rey).

FAUVETTE GRISETTE, DORNGRASMÜCKE

Vue à Martigny le 19.8 et les 16-17.9 (beP, eRe) ainsi qu'à Leuk les 3 et 16.9 (eRe; Rey).

TICHODROME, MAUERLÄUFER

Apparition à basse altitude le 20.10 à Vernayaz, 600 m (jcT) et le 21.10 sous Mase, 650 m (mTh).

RÉMIZ, BEUTELMEISE

4 le 17.10 à Martigny, cris le 23.10 à Vouvry (beP) et dans les filets de Bretolet le 25.10 (frN).

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR, NEUNTÖTER

Découverte d'un ind mort, le 18.8 au bord d'un lac de montagne sur Oberwald, 2160 m (A. Saunier); encore 3 mentions dans la troisième décennie de septembre, puis dernière le 1.10 à Leuk (Rey).

PIE-GRIÈCHE GRISE, RAUBWÜRGER

Une du 14 au 16.11 à Vouvry (beP, eRe, rV).

CASSENOIX, TANNENHÄHER

En plaine le 20.8 à Monthey et le 24.8 à Martigny (rV; beP).

CRABE, ALPENKRÄHE

2 vagabonds en dehors des zones de nidification, le 22.8 au col de Bretolet (Journal de Bretolet).

CHOUCAS, DOHLE

3 mentions de troupes en migration, dont une de 22 ind le 26.10 sur Martigny (beP) et une de 60 ind le 3.11 à Vouvry (rV).

CORBEAU FREUX, SAATKRÄHE

3 ind hors-date le 25.8 à Evionnaz (bPi), puis, à une période bien plus ordinaire pour l'espèce, environ 150 ind le 29.10 et le 3.11 à Vouvry (rV).

CORNEILLE MANTELÉE, NEBELKRÄHE

Une hybride le 28.8 à Collombey-Muraz (nJ), et une signalée à Martigny du 16.9 au 28.10 (beP).

ÉTOURNEAU, STAR

Premier grand rassemblement constaté le 24.8 à Vionnaz (rV). Par la suite, au plus fort de la migration, rV signale les

8 et 21.10 des troupes de respectivement 10000 et 5000 ind quittant la plaine de Monthey en direction du col de Bretolet.

MOINEAU DOMESTIQUE, HAUSSPERLING

2 ind en déplacement capturés au col de Bretolet (frN).

PINSON DU NORD, BERGFINK

En octobre, rA le note particulièrement abondant dans les hêtraies sur Conthey, prémices à l'invasion généralisée qui se dessine dans tout le pays.

BEC-CROISÉ, FICHTENKREUZSCHNABEL

Fort passage remarqué le 19.9 au col de Bretolet, avec un total d'environ 250 migrateurs en une matinée (P. Rapin); plus tard dans la saison, relevons une troupe importante de 120 ind le 31.10 à Zeneggen (Sal).

BRUANT ZIZI, ZAUNAMMER

Capturé le 6.9 au col de Bretolet (frN).

BRUANT FOU, ZIPPAMMER

Entre autres, une trentaine le 7.11 à Salgesch et Varen (Sal).

BRUANT ORTOLAN, ORTOLAN

En migration à Martigny, 1 le 4.9 et 1 le 17.9 (beP).

BRUANT PROYER, GRAUAMMER

Une seule mention au passage, 2 ind le 17.10 à Martigny (beP).

ESPÈCES EXOTIQUES / ÉCHAPPÉS DE CAPTIVITÉ EXOTISCHE ARTEN

BERNACHE DU CANADA, KANADAGANS

Une le 3.3 au Bouveret (jcT).

BERNACHE NONETTE, WEISSWANGENGANS

2 le 18.11 à Collombey-Muraz (rV).

CANARD À COLLIER NOIR, ROTSCHULTERENTE

2 entre le 15.6 et le 20.9 à Vouvry-Vionnaz (hDu, rV).

CANARD CAROLIN, BRAUTENTE

Un le 9.5 à Leuk (dKr).

CANARD MANDARIN, MANDARINENTE

Un le 9.5 à Leuk (dKr), puis présence dès le 26.5 à Sierre, où l'on note un max de 4 ind à partir du 18.11 (Rey, aSi).

FAUCON SACRÉ, WÜRGFALKE

Un ind avec des grelots aux pattes, le 21.10 sur le toit de la cabane des bagueurs à Bretolet (mGe)!

TOURTERELLE MASQUÉE, KAPTÄUBCHEN

Une mention totalement insolite le 31.8 au col de Bretolet (frN; CAvS); notons qu'il n'existe à ce jour en Europe aucune donnée d'oiseaux supposés sauvages (MAUMARY & BAUDRAZ 2000).

PERRUCHES ONDULÉES, WELLENSITTCHE

Une le 24.8 à Leuk (Rey).

Erratum & addendum

Automne 1996

PIPIT À GORGE ROUSSE, ROTKEHLPIEPER

La donnée de Bretolet est à biffer: elle concerne en réalité un Pipit des arbres.

Automne 1997

GOÉLAND MARIN, MANTELMÖWE

La mention de 2 ad le 11.9 au col de Bretolet est à considérer comme nulle.

Hiver 1997/1998

ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ

Le ch signalé le 8.2 (aSi) est de Flanthey, 750 m, et non de Lens.

Printemps-été 1998

HÉRON POURPRÉ, PURPURREIHER

L'ind vu le 1.5 par nJ se trouvait à Vionnaz et non à Monthey.

Indices de nidification 1998

LORIOT, PIROL

Mention de nJ: chante à Vionnaz et non à Monthey.

BIBLIOGRAPHIE

Complétée des publications récentes touchant à l'ornithologie valaisanne

ARLETTAZ, R., J. FOURNIER, B. POSSE, A. SIERRO & N. ZBINDEN. 2000. Suivi 1999 et premiers résultats sur l'occupation des nichoirs en bâtiments. Document interne de la Station ornithologique suisse.

MAUMARY, L. & M. BAUDRAZ. 2000. Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 1999. *Nos Oiseaux* 47: 239-258.

POSSE, B. 2000. Chronique ornithologique romande pour l'automne et l'hiver 1998-1999. *Nos Oiseaux* 47: 167-194.

REVAZ, E. 2000. Chronique ornithologique valaisanne: de l'hiver 1997-1998 à l'automne 1998. *Bull. Murithienne* 117: 73-87.

SCHMID, H., R. LUDER, B. NAEF-DAENZER, R. GRAF & N. ZBINDEN. 1998. *Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse. Distribution des oiseaux nicheurs en Suisse et au Liechtenstein en 1993-1996*. Station ornithologique suisse. Sempach.